



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

หลักการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม อยู่ 16 ตำรับ”



นางสาวอมรรัตน์ ราชเดิม แพทย์แผนไทยชำนาญการ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Outline

1. การดำเนินการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย
2. กัญชาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
3. ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
4. การอบรมผู้ประกอบการวิชาชีพ
5. การปลูกกัญชา และการผลิตตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม
6. การรับรองตำรับยาปรุงเฉพาะราย
7. การศึกษาวิจัย น้ำมันกัญชาสูตรหมอเดชา และการวิจัยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม



กลั่นกรองแล้ว 90 ตำรับ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

ก

ตำรับยาตามองค์ความรู้เป็นที่รู้จักและยอมรับทางการแพทย์แผนไทย ตัวยาหาง่าย ไม่เป็นอันตราย - **16 ตำรับ**

ข

ตำรับยาที่มีประสิทธิผล แต่มีวิธีการผลิตไม่ชัดเจน เช่น บางตำรับมีสัดส่วนของตัวยาไม่ชัดเจน และมีตัวยาหายาก ต้องมีการถอดความรู้ให้ชัดเจน - **11 ตำรับ**

ค

ตำรับยาที่มีกัญชาค่อนข้างน้อย หรือมีฤทธิ์ของกัญชาไม่มาก ควรให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม - **32 ตำรับ**

ง

ตำรับยาที่มีส่วนประกอบอยู่ในอนุสัญญา CITES หรือเป็นตัวยาที่ WHO ประกาศเป็นสารก่อมะเร็ง หรือที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ - **31 ตำรับ**

ตำรับยาที่มีกัญชา ๔ กลุ่ม

กลุ่ม ก จำนวน ๑๖ ตำรับ

- ตำรับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย วิธีการผลิต ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวยาหา ไม่ยาก และมีสรรพคุณ ตำรับที่แก้ปัญหา สาธารณสุข

กลุ่ม ข จำนวน ๑๑ ตำรับ

- ตำรับยาที่มีประสิทธิผล แต่ มีวิธีการผลิตไม่ชัดเจนและมีตัวยาหายาก

กลุ่ม ค จำนวน ๓๒ ตำรับ

- ตำรับยาที่เห็นควรให้มีการ ศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

กลุ่ม ง จำนวน ๓๑ ตำรับ

- ตำรับยาที่มีส่วนประกอบอยู่ในอนุสัญญา CITES และ WHO ประกาศ และมีตัวยา ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้

ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ๑๖ ตำรับ

๑ ยาอัคคินีวคณะ

- คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์
- แก้กลิ้นเหียนอาเจียน เบื่ออาหาร พะอืดพะอม

๒ ยาสุขไสยาสน์

- คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์
- ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร แก้อาการอ่อนล้า

๓ ยาแก้ลมเนาวนาริยาโย

- ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- คลายอาการปวดตึงบริเวณปลายมือปลายเท้า ร้าวไปกำด้นต้นคอ

๔ ยาน้ำมันสนันไตรภพ

- ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, จารึกตำรายาวัตราชโอรสราชมวริวิหาร
- แก้กษัยเหล็ก แก้กตาน แก้อาการปวดแข็งเกร็งหัวเห่าท้องน้อยเจ็บตึงถึงยอดอก

๕ ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง

- ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- แก้อาการปวดศีรษะ หน้ามืด หูอื้อ ใจสั่น อ่อนเพลีย สวิงสวาย

๖ ยาไฟอาวุธ

- แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช
- แก้ปวดมวนจุกเสียดมีอาการท้องอืดพอง

๗ ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง

- แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช
- แก้อาการอ่อนเพลียผอมแห้ง ตัวสั่นมือสั่น กินข้าวไม่ได้ นอนไม่หลับ

๘ ยาแก้สั่นทขาด กล่อนแห้ง

- แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช
- แก้ท้องผูกปวดเมื่อยจุกเสียดท้องน้อยแน่นหน้าอก

๙ ยาอัมฤตโอสถ

- แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช
- แก้ตึงเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ มือเท้าแขนขาอ่อนโรย

๑๐ ยาอโภยสาลี

- เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช
- แก้โรคลม บำรุงร่างกาย

๑๑ ยาแก้ลมแก้เส้น

- เวชศาสตร์วินณา
- บรรเทาอาการปวดเมื่อยตึงตามร่างกาย

๑๒ ยาแก้โรคจิต

- อายุรเวทศึกษา (ขุนนิเทศสุขกิจ) เล่ม ๒
- ลดความวิตกกังวล ลดความเครียด ช่วยให้นอนหลับ

๑๓ ยาไฟสาลี

- อายุรเวทศึกษา (ขุนนิเทศสุขกิจ) เล่ม ๒
- แก้โรคลม บำรุงร่างกาย

๑๔ ยาหาริตสีดวงทวารหนัก โรคผิวหนัง

- อายุรเวทศึกษา (ขุนนิเทศสุขกิจ) เล่ม ๒
- รักษาโรคสีดวงทวาร โรคผิวหนัง

๑๕ ยาทำลายพระสุเมรุ

- คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์
- แก้เกร็งปวดเมื่อยตึงขา กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง

๑๖ ยาทัพยาธิคุณ

- คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์
- ปวดตึงเมื่อยตามร่างกาย มือเท้าชาแขนขาอ่อนโรย





1



ตำรับยาแผนไทย ที่มีถิ่นฐานเป็นส่วนผสม จำนวน 16 ตำรับ

ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ
บรรเทาอาการเจ็บปวดท้องแข็ง
ตามขึ้นไปถึงสะดือ
กินอาหารไม่ได้

ยาอักษณีนวคณ:
แก้คลื่นเหียนอาเจียน
เจริญอาหาร บำรุงกำลัง

ยาคุชไสยาสน์
ช่วยให้นอนหลับ
เจริญอาหาร

ยาแก้ลมชั้นเบื่องสูง
บรรเทาอาการปวดศีรษะ
ตามแดง หูตึง มีเสียงหวัด
อื้ออาน้ำหู สวิงหวัด

ยาฟอวูร
แก้ลมจุกเสียด
ปวดมวนท้อง

ยาแก้ลมเนาวนารีไวย
แก้อาการปวดตึงบริเวณ
ปลายมือปลายเท้า
พันหรือเขียวคล้ำไม่ได้

ยาแก้ลิ้นทขาด กล่อนแห้ง
บรรเทาอาการท้องผูก
ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ขับลม

ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง
1) แก้ไม่หลับ
2) แก้ไข้ผอมเหลือง มีอาการตัวร้อน
เสียงดัง อ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง



2



ตำรับยาแผนไทย ที่มีถิ่นฐานเป็นส่วนผสม จำนวน 16 ตำรับ

ยาแก้โรคจิต*
ลดความโกรธ ความเครียด
ช่วยให้ผ่อนคลาย
ใช้โดย แพทย์แผนไทย

ยาอัมฤตโอสถ
บรรเทาอาการตึงกล้ามเนื้อ
เส้นเอ็น มือ เท้าชา ผอมแห้งแรงน้อย
จากความเสื่อมของร่างกาย

ยาไพสาลี
บรรเทาอาการจุกเสียด
แน่นเฟ้อ ขับลม
ช่วยให้หลับสบาย

ยาอโกลยาสาลี
ช่วยขับลม
บรรเทาอาการจุกเสียด
แน่นเฟ้อ

ยาทำลายพระสุเมรุ
บรรเทาอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ
แขนขาอ่อนแรง และอาการชา
ในผู้ป่วยอัมพาต

ยาแก้ลมแก้เส้น
บรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ
ลดอาการมือเท้า ชา อ่อนกำลัง

ยาทิพย์ยาริคุณ
แก้จุกเสียดท้องแข็งเป็นเถาตาม
อาการอัมพาต เสียงแหบแห้ง
ปวดเมื่อยร่างกาย นอนไม่หลับ

ยาหาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง
ทวารรักษาโรคสีดวงทวารหนัก
และทวารรักษาโรคผิวหนัง



Kan-Ja (by DTAM)

01

การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

ตำรับยาสุขไสยาสน์ * ตำรับยาแก้ลมชัก (ยาแก้ไข้ผอมเหลือง) * ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น *
ตำรับยาหาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง * ตำรับยาอัมฤตโอสถ * ยาแก้โรคจิต
* ตำรับยาอัคคีนิ่วคณะ * ยาไฟอาวุธ *

อ้างอิงข้อมูลจากการเอกสารประกอบการสอนอบรมวิทยากร ครู ก. การใช้กัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย
วันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
โดยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา

02

การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ - ยาไพสาลี - ยาทำลายพระสุเมรุ - ยาอภัยสาลี

อ้างอิงข้อมูลจากการเอกสารประกอบการสอนอบรมวิทยากร ครู ก.
การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
วันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
อ.เนตรดาว ยวงศรี

03

การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง - ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย -
ยาแก้สันตฆาต กล่อนแห้ง - ยาทัพยาริคุณ

อ้างอิงข้อมูลจากการเอกสารประกอบการสอนอบรมวิทยากร ครู
ก. การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
วันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
อ.ฉัตรวันชัย พวงมาลัย

เสนอประกาศตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 16 ตำรับ



ลำดับ	ชื่อตำรับยา	ข้อบ่งใช้
1.	ยาสุขไสยาสน์	ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร
2.	ยาทำลายพระสุเมรุ	แก้ลมจุกเสียด ลมเมื่อยขบในร่างกาย ลมเปลี่ยนดำ ลมอัมพฤกษ์อัมพาต
3.	ยาแก้ลมแก้เส้น	แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการมือเท้าชา อ่อนแรง
4.	ยาทาริตสีดวงทวารหนัก และโรคผิวหนัง	ทาแก้ริดสีดวงทวารหนัก และโรคผิวหนัง (เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก)
5.	ยาอัคคินิวคณะ	แก้คลื่นเหียนอาเจียน ที่เกิดจากไฟย่อยอาหารผิดปกติ
6.	ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย	แก้ลมเนาวนารีวาโย (ลมที่ทำให้มีอาการเจ็บแปล็บที่ปลายมือปลายเท้า ต้นคอตึงแข็งเกร็ง หันคอไม่ได้)
7.	ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ	แก้กษัยเหล็ก (กษัยอันเกิดจากอุปาทิกะโรคชนิดหนึ่ง เกิดจากลมอัดแน่นแข็งเป็นดานอยู่ในท้องน้อย เจ็บปวดท้องแข็งลามไปถึงยอดอก กินอาหารไม่ได้)
8.	ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง	แก้ลมขึ้นเบื้องสูง (เป็นลมที่ทำให้มีอาการปวดศีรษะ ตาแดง หูตาฝ้าฟาง หูอื้อ อ่อนเพลีย สวิงสวาย)

ประกาศตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 16 ตำรับ (ต่อ)



ลำดับ	ชื่อตำรับยา	ข้อบ่งใช้
9.	ยาไฟอาวุธ	แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง แก้กานเสมหะ (เสมหะที่คั่งค้างในลำไส้ทำให้ท้องแข็งปวดมวน)
10.	ยาแก่นอนไม่หลับ ยาแก้ไข้ผอมเหลือง	แก่นอนไม่หลับ แก้ไข้ผอมเหลือง ตัวสั่น เสียงสั่น อ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง
11.	ยาแก้สันทฆาตกล่อนแห้ง	บรรเทาอาการท้องผูกเป็นพรรดิก ปวดเมื่อทั่วร่างกาย มือชาเท้าชา ปวดศีรษะ หน้ามืด วิงเวียน จุกเสียดท้อง แน่นหน้าอก เกิดจากโทสันทฆาตและกล่อนแห้ง
12.	ยาอัมฤตย์โอสถ	แก้ลมกษัย (ลมที่ทำให้ผอมแห้งแรงน้อย มึนตึ๊ง มือเท้าอ่อนแรง)
13.	ยาอโภยสาลี	แก้โรคทางลม บรรเทาอาการจุกเสียดแน่น
14.	ยาแก้โรคจิต	แก้ลมที่ทำให้กังวล เครียด นอนไม่หลับ
15.	ยาไฟสาลี	แก้โรคลม แก้หืดไอ มีเสมหะ
16.	ยาทัพยาริคุณ	แก้ร้อนที่ทำให้จุกเสียดเป็นพรรดิก เจ็บเมื่อยขบตามร่างกาย กินอาหารไม่รู้รส นอนไม่หลับ



บัญชีรายชื่อตำรับยาแผนไทย วัตถุประสงค



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ประโยชน์ของกัญชาในยาไทย

กินข้าวได้ ทำให้กายมีกำลัง
บำรุงประสาททำให้นอนหลับสบาย



16 ตำรับยากัญชา แก้โรคอะไรบ้าง?

- 1 ยาสุขไสยาสน์**
ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร
ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- 2 ยาน้ำมันสนับไตรภพ**
ช่วยลดอาการเกร็งข้อ
ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก
มะเร็งตับในระยะเริ่มต้น
- 3 ยาทำลายพระสุเมรุ**
บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ
แขนขาอ่อนแรงชา
ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
- 4 ยาทัพยาริคุณ**
ลดอาการมือชาเท้าชา
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และใช้รักษาอาการมือเท้าบวม
ในผู้ป่วยมะเร็งตับ
- 5 ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง**
แก้ลม
- 6 ยาแก้นอนไม่หลับ**
ยาแก้ไข้พอมเหลือง
- 7 ยาไพศาลี**
บำบัดโรคลม นอนไม่หลับ
- 8 ยาหาริดสีดวงทวารหนัก
และโรคผิวหนัง**
- 9 ยาแก้ลมแก้เส้น**
บรรเทาอาการปวดตึง
กล้ามเนื้อตามร่างกาย
- 10 ยาโกลยสาลี**
บำบัดโรคทางลม
- 11 ยาอัมฤตโอสถ**
บรรเทาอาการกล้ามเนื้อ
เส้นเอ็นรัดรั้ง มือเท้าชา
- 12 ยาแก้โรคจิต**
- 13 ยาแก้สัณห์พมัต กร่อนแห้ง**
บรรเทาอาการท้องผูก
ปวดเมื่อยทั่วร่างกาย
- 14 ยาอัคคินิวคณะ**
แก้คลื่นเหียนอาเจียน
- 15 ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย**
แก้อาการทางลม
คลายอาการเจ็บปวดตึง
บริเวณปลายมือปลายเท้า
- 16 ยาไฟอาวุธ**
แก้ลมจุกเสียด อ่อนเพลีย
ไม่มีแรง

ข้อมูล : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

หลักการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม อยู่ 16 ตำรับ

ตำรับยาสุขไสยาสน์

ที่มาของตำรับยา คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์

“ยาสุขไสยาสน์ ให้เอา การบูร ๑ ส่วน ใบสเดา ๒ ส่วน สหฺสคุณเทศ ๓ ส่วน สมุลแว้ง ๔ ส่วน เทียนดำ ๕ ส่วน โกฏกระดูก ๖ ส่วน ลูกจันทน์ ๗ ส่วน ดอกบุนนาค ๘ ส่วน พริกไท ๙ ส่วน ขิงแห้ง ๑๐ ส่วน ดีปลี ๑๑ ส่วน ใบก้นชา ๑๒ ส่วน ทำเปนจุนละลายน้ำผึ้งเมื่อจะกินเคกด้วย ทัพพีติโย ๓ จบ แล้วกินพอควร แก่สรรพโรคทั้งปวงหายสิ้น มีกำลังกินเข้าได้นอนเป็นสุขนั้กแลฯ”



ยาสุขไสยาศน์



ที่มาของตำรับยา : คัมภีร์ธาตุนเรนารายณ์

“ยาสุขไสยาศน์ ให้เอา การบูร ๑ ส่วน ใบสเดา ๒ ส่วน สหสคุณเทศ ๓ ส่วน
สมุลแว้ง ๔ ส่วน เทียนดำ ๕ ส่วน โกฏกระดูก ๖ ส่วน ลูกจันทน์ ๗ ส่วน ดอกบุนนาค ๘ ส่วน
พริกไท ๙ ส่วน ขิงแห้ง ๑๐ ส่วน ดีปลี ๑๑ ส่วน **ใบกัญชา ๑๒ ส่วน** ทำเป็นจุณละลาย
น้ำผึ้ง เมื่อจะกิน เสดกด้วยสัพพีติโย ๓ จบ แล้วกินพอควร แก่สรรพโรคทั้งปวงหายสิ้น มี
กำลังกินเข้าได้ นอนเป็นสุขนั้กแลฯ”

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตำรายา ๑๒ ชนิด รวมน้ำหนัก ๗๘ ส่วน ดังนี้

The background of the slide features a close-up of Arjaro Herb product packaging. A large purple label with white Thai text is visible at the top, and several smaller purple sachets with white text and a star logo are shown below it. The text on the packaging includes 'Arjaro Herb', 'ยาแผนไทย' (Thai Herbal Medicine), and 'ช่วยให้นอนหลับ' (helps with sleep).

รูปแบบยา : ยาผง

ขนาดและวิธีการใช้ : ทำเป็นจุนละลายน้ำผึ้ง คือการ
รับประทานขนาดเม็ดลูกกลอนขนาดเท่าผลมะแว้ง ซึ่งน้ำผึ้ง
เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว จะพายาคูดชื่นได้เร็ว ใช้ในผู้ที่มี
อาการอ่อนเพลีย ต้องการพลังงาน หรือใช้ผงใส่แคปซูล
รับประทาน



ตำรับยาคุขไสยยาศน์ *



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ตำรับนี้ใช้ทดแทน

ยานอนหลับ**

/อาการตื่นกลัว/ลดอาการวิตกกังวล/

ไม่อยากอาหาร**

- รสประธานตำรับยา: รสสุขุมออกร้อน
- สรรพคุณตำรับยา: แก้**อาการนอนไม่หลับ**ช่วยลด**อาการวิตกกังวล**ทำให้รู้สึกอยากอาหาร และตัวยาอื่นจะมีรสร้อนเป็นส่วนใหญ่ ช่วยจุดไฟย่อยที่หย่อน ทำให้**ระบบย่อยกลับมาทำงาน**ได้ดีขึ้น กินอาหารได้มากขึ้นลดอาการจุกเสียดท้อง จาก
กองลมในไส้ และกองลมนอกไส้ จึงทำให้ผู้ใช้มีกำลังกลับคืน




การบูร ใบสะเดา หัสศุณเทศ สมุลแว้ง เทียนดำ
โกฐกระดูก ลูกจันทร์ บุนนาค พริกไทย ขิงแห้ง ดีปลี
ใบกัญชา

ตำรับยาสุขไสยาสน์ ขนานที่ 44 ในตำราพระโอสถพระนารายณ์ มีตัวยา 12 ตัว

- ข้อบ่งใช้: ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร
- เปอร์เซ็นต์ของกัญชาในตำรับ: 15.38% (คิดเป็นน้ำหนักกัญชาประมาณ 300 มก. /ผงยา 2 กรัม มีปริมาณ THC 9.21 MG CBD 27.45 NG. ต่อผงยา 1 กรัม)***1,000,000 NG.= 1 MG
- ขนาดที่แนะนำให้ใช้: 2 กรัม ก่อนนอน ใช้น้ำผึ้ง/น้ำต้มสุกเป็นน้ำกระสายยา

แผนภูมิที่ 2 แนวทางการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคไต



สิ่งที่พบบ่อย



รูปแบบของยา เป็นผง กินยาก กินแล้ว แทนที่จะหลับ กลับนอนไม่หลับ เหงื่อออก กระสับกระส่าย ใช้ในผู้ป่วยไมเกรนได้ดี ทำให้ความถี่ของอาการปวด

ศีรษะลดลง ใช้ควบคู่กับยาหอมเทพจิตร

ระวังผู้ป่วยที่มีภาวะโรคกรดไหลย้อน

หรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

ปรับปริมาณการรับประทาน

นอนไม่หลับ. เป็น 0.5 - 2 กรัม ก่อนนอน

เบื่ออาหาร. เป็น 0.5 - 2 กรัม ก่อนอาหาร เข้าและเย็น

เปลี่ยนวิธีกิน

ปั้นลูกกลอน กับน้ำผึ้ง

ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ

ที่มาของตำรับ : คัมภีร์แพทย์แผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์

“ลูกจันทน์ ๑ ส่วน ดอกจันทน์ ๒ ส่วน ลูกกระวาน ๓ ส่วน
กานพลู ๔ ส่วน ดีปลี ๕ ส่วน เปลือกสนเหว ๖ ส่วน ว่านน้ำ ๗ ส่วน
โกฐสอ ๘ ส่วน โกฐเขมา ๙ ส่วน เทียนดำ ๑๐ ส่วน เทียนแดง ๑๑ ส่วน
เทียนขาว ๑๒ ส่วน เทียนตาตุ่ม ๑๓ ส่วน เทียนข้าวเปลือก ๑๔
ส่วน ขิงแห้ง ๑๕ ส่วน กัญชา ๑๖ ส่วน รากเจตมูลเพลิง ๑๗ ส่วน เนื้อ
สมอไทย ๑๘ ส่วน บุกรอ ๑๙ ส่วน เนื้อสมอเทศ ๒๐ ส่วน การบูร ๒๑
ส่วน หัตถ์คุณเทศ ๒๑ ส่วน พริกไทยล่อน ๔๖๒ ส่วน”





ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู เกลือสินเธาว์ ดีปลี ว่านน้ำ โกฐสอ
โกฐเขมา เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนดำตึกแตง เทียนขาว
เปลือก ขิงแห้ง **กัญชา** เจตมูลเพลิง หัวบุงร่อ สมอไทย สมอเทศ การบูร
หัตถ์คุณเทศ พริกไทยอ่อน

ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ. จากคัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 2 ชุนโรสภิตบรรณลักษณะ

มีตัวยา 23 ชนิด

- ข้อบ่งใช้: แก่ลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึ๊ง ลมเมื่อยขบในร่างกาย ลมสะดุ้ง และสันไปทั้งตัว ลมเปลี่ยนดำ ลมอัมพฤกษ์อัมพาต ลมปัตคาศท กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- เปอร์เซ็นต์ของกัญชาในตำรับ: 2.23% (คิดเป็นน้ำหนักกัญชาประมาณ 44 มก. /ผงยา 2 กรัม มีปริมาณ THC 12.08 MG CBD 691.04 NG. ต่อผงยา 1 กรัม)***1,000,000 NG.= 1 MG
- ขนาดที่แนะนำให้ใช้: 1/2 ชอง ก่อนนอน ใช้น้ำอ้อยแดง/น้ำนมโค/น้ำต้มสุกเป็นน้ำกระสายยา

แบบภูมิที่ 3 แนวทางการใช้ยาตำรับฟ้าลาภพระฤๅณ

ผู้ป่วยโรคสมองพิการจะมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเคลื่อนไหว ซึ่งผู้ป่วยโรคสมองพิการจะมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเคลื่อนไหว ซึ่งผู้ป่วยโรคสมองพิการจะมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเคลื่อนไหว

ข้ากรรณวิดิและตรวจร่างกาย
ประณามคณเพื่อวามนการวิดิษา

พิจารณาว่าขนาดแบบมีปฏิชีวนะโรคราน้ำค้าง เช่น

<input type="checkbox"/> ขนาดเล็กจนขาด	<input type="checkbox"/> ขนาดเล็กจนขาด
<input type="checkbox"/> ขนาดเล็กจนขาด	<input type="checkbox"/> ขนาดเล็กจนขาด
<input type="checkbox"/> ขนาดเล็กจนขาด	<input type="checkbox"/> ขนาดเล็กจนขาด

เป็นเวลา 7-15 วัน

- ☐ ยานยนต์ส่วนบุคคล
 - ☐ ยานพาหนะประจำตัว
 - ☐ ยานพาหนะสาธารณะ

เฉลี่ย 7-15 วัน

ตัดสินใจ

100

1. ប្រែប្រួលជាមួយការផ្លាស់ប្តូរតាមការ
 វិភាគស្រាវជ្រាវ (ឬការ ១ ឆ្នាំ)

ไม่พบข้อห้ามใช้

จำเพาะตัวรับยาที่สายพระสุเมรุ
สิ้นเวลา 7 - 15 วัน

1

ประเมินและพิจารณาการรักษาคือเมื่อ
ทุก 2 สัปดาห์

พิจารณาเหตุการณ์ที่ศึกษา เมื่ออาการของโรคโดยทั่วไปปกติโดยไม่ต้องการใช้ยา

ปริมาณน้ำตก 1 เดือน

A diagram showing a diamond-shaped structure with a vertical line extending downwards from its center. The label "la" is positioned next to the vertical line.

1919

พิจารณาแนวทางการรักษาอื่น

สิ่งที่พบบ่อย



รูปแบบของยา เป็นผง กินยาก
ใช้ในผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต โรคพาร์กินสัน
โรคลมชักได้ ทำให้ความถี่ของการชักลดลง
สามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชที่มี

อาการนอนไม่หลับได้

ปรับปริมาณการรับประทาน

รับประทานครั้งละ 2-3 กรัม

ก่อนอาหารเช้าและเย็น

เปลี่ยนวิธีกิน

ปั่นลูกกลอน กับน้ำผึ้ง

รูปแบบยา ยามง

สรรพคุณ

- แก่ลมจุกเสียด ลมปะทะอก ลมตามือหูหนัก ปวดหัวมึนตึ๊ง ลมเมื่อยขบในร่างกาย ลมสะดุ้งและสั่นไปทั่วตัว ลมเปี้ยวดำ(เกี้ยวดำ, ตะคริว) แก่จุฬาม้ามย่อย มานกษัย ไส้พอง ท้องใหญ่ ลมคลั่งเพ้อ ลมอัมพฤกษ์อัมพาต ลมปัตคาคาต แก่โรคผิวหนัง ลมชักปากเปี้ยวตาแหก แก่ริดสีดวงทวาร แก่โรคเสมหะ โลหิตเรื้อรัง

- ใช้ในกลุ่มอาการอัมพฤกษ์อัมพาต บรรเทาอาการ กลืนอาหารได้ดีขึ้น อาการลำลัก ลดลง พูดได้ชัดเจนขึ้น น้ำลายไหลจากมุมปากลดลง ในระยะเวลา ๒ สัปดาห์ แต่ยังคงต้องให้ผู้ป่วยดื่มน้ำจากหลอดเพื่อป้องกันการลำลัก ทำให้ปอดชื้น

- ยานี้ไม่ช่วยเรื่องการนอนหลับ และอาการม้ามโต (ตำรับตรีวาสังแก้ม้ามโต ในระยะเวลา ๑ เดือน) หากอยากให้นอนหลับสามารถหยदन้ำมันกัญชาก่อนนอนได้

- แก่ลมปัตคาคาต ปวดหลังร้าวลงขา แต่ไม่สามารถแก้ไขในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการปวดจากกระดูกทับเส้นประสาท แล้วทำให้เดินไม่ได้

- แก่ลมเปี้ยวดำ หรือตะคริว ตามท้อง ขา น่อง เนื่องจากการขาดเกลือแร่

ขนาดและวิธีการใช้ : รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

- กรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาทำลายพระสุเมรุ ขณะที่มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ต้องให้ยาครั้งละ ๑-๒ สัปดาห์ (ขนาดยาประมาณ ๕๐๐ มิลลิกรัม/ครั้ง) แล้วสังเกตอาการผู้ป่วยในครั้งถัดไปว่ามีการเปราะแตกของเส้นเลือด มีจำเผลียงเขียว แดงบริเวณผิวหนังหรือไม่ หากพบสัญญาณดังกล่าวให้ลดขนาดยาที่รับประทานลง
- ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตควรรับประทานยา ร่วมกับการบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เช่น นวดบำบัดฟื้นฟูหรือการกายภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้น
- สามารถใช้ตำรับยาทำลายพระสุเมรุร่วมกับยาหอม เช่น ยาหอมเทพจิตร ยาหอมอินทจักร ยาจิตรารมณ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด พร้อมการนวดบำบัด (เพิ่มจุดกดจุดโคนลิ้น) เพื่อควบคุมความดันโลหิต และการรับประทานอาหารให้ถูกต้อง
- ผู้ป่วยอาการที่ดีขึ้นและแพทย์พิจารณาแล้วว่าควรลดขนาดยา ไม่ควรงดยาทันที ให้ลดยาโดยการเว้นระยะเวลาการรับประทานยา กล่าวคือ จากเคยรับประทาน ๓ เวลา เป็น ๒ เวลา, ๑ เวลา ตามลำดับ จาก ๒ เม็ดลดลงเหลือ ๑ เม็ดระยะหนึ่ง แล้วสังเกตอาการผู้ป่วย ก่อนปรับเป็นรับประทานวันเว้นวัน และหยุดยาในที่สุด

ข้อควรระวัง - ผู้ป่วยที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือด และแผลในกระเพาะอาหาร ให้รับประทานตำรับยาทำลาย
พระสุเมรุหลังอาหาร บางรายอาจปรับลดปริมาณยา

- **การเตรียมน้ำกระสายยา**
- น้ำนมโค ใช้เพื่อป้องกันการออกฤทธิ์ของพริกไทยไม่ให้มากเกินไป หรือน้ำนมโคใช้เป็นกระสายเพื่อปั่นยา
ลูกกลอน โดยใช้ใช้น้ำนมดิบต้ม ใช้ส่วนบนของน้ำนมที่เป็นแผ่นไข มีสีขาวเข้มปนเหลือง มาพักจนเย็นก่อนเค้ล้ายา
- น้ำข้าวเช็ด ใช้เป็นกระสายปั่นยาลูกกลอน แต่ต้องเลือกสายพันธุ์ เช่น ดำกันยา สังข์หยด ให้นำข้าวมาต้มจนขึ้น
แล้ว กรองเอาน้ำ มาเค้ล้ายา
- น้ำอ้อย (อ้อยแดง) เน้นเรื่องการขับปัสสาวะให้เพิ่มขึ้น ทำน้ำเบาให้บริสุทธิ์ เช่น ไม่มีเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
โปรตีน อัลบูมินต่างๆ เป็นต้น โดยนำน้ำอ้อยแดงเคี้ยวจนงวดเหนียวแล้วผสมผงยาจึงรับประทาน อย่างไรก็ตาม
ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่เป็นโรคเบาหวานร่วมด้วย ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำอ้อย

ผลวิเคราะห์ตำรับยาทางห้องปฏิบัติการ



ตำรับยาสุขไสยาศน์

ปริมาณสารสำคัญใน 1 กรัม

THC : 9.21 mg

CBD : 27.45 ng

CBN : 613.60 ng

CBG : 103.46 ng



ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ

ปริมาณสารสำคัญใน 1 กรัม

THC : 12.08 mg

CBD : 691.04 ng

CBN : 1,379.93 ng

CBG : 905.70 ng

ตำรับแก้ลมแก้เส้น

ที่มาของตำรับยา เวชศาสตร์วัฒนธรรม ตำราแพทย์แบบเก่า เล่ม ๕
“ ขนานหนึ่งเอา เทียนขาว ๑ เทียนดำ ๒ เทียนขาวเปลือก
๓ ขิง ๔ เจตมูล ๕ ใบกัญชา ๒๐ พริกไทย ๔๐ ทำเป็นจุณละลาย
น้ำผึ้ง น้ำส้มชากินแก้เส้นแก้เมื่อยเหน็บชาแก้ตื่นตายมือตายหายตีนัก

”



สูตรตำรับยา ประกอบด้วยตัวยา ๗ ชนิด รวมน้ำหนัก ๗๕ ส่วน

ลำดับ	สมุนไพร	น้ำหนักยา	รส	สรรพคุณ
๑	เทียนขาว	๑ ส่วน	เผ็ดร้อนขมหอม	แก้ลมและตีพิการ ขับเสมหะ แก้ไข้ ขับระดูขาว ขับผายลม แก้ท้องขึ้นในเด็ก นำมาสกัดได้น้ำมันยี่หระใช้ทำเครื่องหอม เครื่องคัมและขับลม
๒	เทียนดำ	๒ ส่วน	เผ็ดขม	- ขับเสมหะให้ลงสู่อุจจาร ขับลมในลำไส้ แก้อาเจียน บำรุงโลหิตให้บริบูรณ์ - ระวังอาการปวด ยาแก้ปวดฟัน โดยการผ่าแล้วเอาควันทอมเข้าไปในปาก
๓	เทียนข้าวเปลือก	๓ ส่วน	หวานเผ็ดหอม	บำรุงกำลัง ขับผายลม แก้เส้นศูนย์กลางท้องพิการ แก้ชีพจรอ่อนหรือพิการ แก้นอนสะดุ้ง (โทษน้ำดี) แก้คั่ง

ลำดับ	สมุนไพร	น้ำหนักยา	รส	สรรพคุณ
๔	ขิง	๔ ส่วน	หวานเผ็ดร้อน	ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญอากาศธาตุ กระตุ้น การบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้
๕	เจตมูลเพลิง	๕ ส่วน	ร้อน	บำรุงโลหิต ขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ ขับ โลหิตระดู แก่ริดสีดวงทวาร เคลื่อนฝี ให้ความอบอุ่น แก่ร่างกาย กระจายเลือดลม มีฤทธิ์บีบมดลูกทำให้แท้ง ได้ ทาแก้โรคผิวหนัง
๖	ใบกัญชา	๒๐ ส่วน	เมาเบื่อ	แก้หอบหืด เจริญอาหาร ชูกำลัง แต่ทำให้ขลาด ตาลาย ประสาทหลอน ระงับปวด ช่วยให้นอนหลับ
๗	พริกไทย	๔๐ ส่วน	เผ็ดร้อน	แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมลั่นในท้อง บำรุงธาตุ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้เสมหะเฟื่อง แก้มูกิด

สรรพคุณ



1. แก้มลม แก่เส้น แก่เมื่อย แก่เหน็บชา แก่ตื่นตายมีอตาย



2. ลมปลายปัดฆาต ลัญญาณ ๑, ๓ หลัง : รับประทานยาแก้ลมแก้เส้น
ร่วมกับยาเถาวัลย์เปรียง



3. อัมพฤกษ์ - อัมพาต : รับประทานยาแก้ลมแก้เส้น ร่วมกับพิกัดทศกุลา
ผล (พิกัดทศกุลาผล ประกอบด้วย ผักชีล้อม ผักชีลา เร่วน้อย เร่วใหญ่
ชะเอมไทยชะเอมเทศ ลำพันแดง ลำพันขาว อบเชยไทย และอบเชยเทศ



4. ลดไขมันในเส้นเลือด



เกียนขาว เกียนดำ เกียนข้าวเปลือก ชิง

เจตมูลเพลิง **ใบกัญชา** พริกไทย

ตำรับแก้ลมแก้เส้น จากตำราเวชศาสตร์วิวัฒน์นา มีตัวยา 7 ชนิด

- ขอบ่งใช้: แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการมือเท้าชา กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง
- เปอร์เซ็นต์ของกัญชาในตำรับ: 26.67% (คิดเป็นน้ำหนักกัญชาประมาณ 533 มก. / พงยา 2 ๕)
- ขนาดรับประทาน/วิธีการใช้ ที่แนะนำ: รับประทานครั้งละ 1-4 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร
เช้า-เย็น ใช้น้ำผึ้งรวง / น้ำส้มซ่า / น้ำต้มสุกเป็นน้ำกระสายยา

ขนาดและวิธีการใช้



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

(Medical Cannabis Clinic)



ตำรับแก้ลมแก้เส้น



รับประทานครั้งละ ครั้งช้อนชา ๑ ช้อนชา

- ละลายน้ำผึ้ง (บำรุงกำลัง ให้พลังงานในกล้ามเนื้ออ่อนแรง)
- ละลายน้ำส้มชากิน (การไหลเวียนเลือดลม ลมเดินสะดวก กัดเสมหะ)



: วิธีการน้ำส้มช่า ให้คลึงเปลือก เพื่อต้องการน้ำมันในผิวส้มช่ารวมกับน้ำส้มช่า จะออกมาเป็นเนื้อครีมสีเขียวอ่อน จากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบาง เอาเฉพาะน้ำและน้ำมันชั้นผิวของเปลือกส้มช่า (พืชตระกูลส้มจะทำการเปาะแตกของหลอดเลือด เกิดการยืดหยุ่นของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดเหนียวยืดหยุ่นมาก

ขนาดและวิธีการใช้



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

(Medical Cannabis Clinic)




ตำรับแก้ลมแก้เส้น

หมายเหตุ : - ผู้ป่วยที่มีภาวะกรดไหลย้อน จะแสบร้อนคอ จึงให้ป็นยาเป็นลูกกลอน หรืออัดเป็นแคปซูล และผู้ป่วยมีภาวะเครียด อาจจะให้น้ำมันกัญชาหรือยาจิตรากรมน์ รับประทานก่อนนอนร่วมด้วย

ข้อควรระวัง - ผู้ป่วยที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือด, ท้องอืดท้องเฟ้อ, ไทรอยด์เป็นพิษ ให้รับประทานยาแก้ลมแก้เส้นหลังอาหาร บางรายอาจปรับลดปริมาณยา

แผนภูมิที่ 14 แนวทางการใช้ยาแก้อักเสบ



สิ่งที่พบบ่อย

รูปแบบของยา เป็นผง กินยาก
ลดอาการปวดเข้า ปวดหลัง อาการปวดเรื้อรังได้ดีมาก
หลังใช้อาจมีอาการผื่นคันตามตัว ร้อนในปาก

กระหายน้ำ

ปรับปริมาณการรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1-4 กรัม

ก่อน(หลัง)อาหาร เข้าและเย็น

เปลี่ยนวิธีกิน

ปั้นลูกกลอน กับน้ำผึ้ง



ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น *



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ตำรับนี้ใช้รับทานประกอบหัตถการนวาดดียิ่ง
และใช้ได้ดีกับผู้มีอาชีพในอริยาบถนั่งนานๆ

- รสประธานตำรับยา: รสร้อนมาก
- สรรพคุณตำรับ: บรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อตามร่างกายบรรเทาอาการขัดแย้ง
ขัดขาค ไม่สบายเนื้อสบายตัวบรรเทาอาการทางอาชีพสำนักงานอาการลมเหน็บ ลม
ชา ลมตะคริว บริเวณปลายมือปลายเท้าอาการแขนขาอ่อนแรง ไม่มีกำลัง จากไฟ
ธาตุหย่อนอาการเย็นบริเวณปลายมือปลายเท้า



ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น *



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

วิธีรับทาน:

- ไม่ควรทานยาเกินกว่า **หนึ่งสลึง-หนึ่งไฟ** ต่อครั้งรับทาน (น้ำผึ้งเจือน้ำส้มซ่าแทรกเกลือแต่น้อยใช้เป็นกระสายรับทานไปพร้อมกับตำรับยานี้) ตำรับนี้พึงเป็นยาผง
- ในหนึ่งวันไม่ควรรับทานเกินกว่า **สองสลึง-สองไฟ**
- ไม่ควรรับทานติดกัน ควรเว้นช่วงห่างอย่างน้อยหนึ่งกาลในหนึ่งวัน

กรณีศึกษา : ถ้าผู้ป่วยกลุ่มโรคลมอัมพฤกษ์ – อัมพาต มาเข้ารับ
การรักษา ควรจ่ายจ่ายตำรับยาแก้ลมแก้เส้น หรือยาตำรับ
ทำลายพระสุเมรุ

ตำรับทำลายพระสุเมรุ = แก้มือตายเท้าตาย ลมที่เกิด
จากการปะทะ ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดเกลือแร่ ที่เรียกว่าเพลวดำ
หรือเกียวกดำ มีตัวยาที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนมากกว่า

ตำรับแก้ลมแก้เส้น = แก้มือตายเท้าตาย แก้ลมในเส้น
หลอดเลือด การไหลเวียนของลม ลดความเครียด อารมณ์ดีขึ้น
มีอาการเสียวในเส้น แสบบริเวณหลังมือหลังเท้า





ขมิ้นชัน. **ใบกัญชา** น้ำมันเมล็ดฝ้าย

ตำรับยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง จากตำราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทศสุขกิจ) เล่ม 2
มีตัวยา 3 ชนิด

- ขอบ่งใช้: รักษาหัวริดสีดวงทวารหนักที่อักเสบ รักษาโรคผิวหนัง
- ขนาดรับประทาน/วิธีการใช้ ที่แนะนำ: ทาวันละ 2 ครั้ง หลังอาบน้ำเช้าและเย็น



ตำรับยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

๑๔. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง

ที่มาของตำรับยา อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทศสุขกิจ) เล่ม ๒

“เอาขมิ้นชัน ใบกัญชา สิ่งละ ๑๕ กรัม น้ำมันเมล็ดฝ้าย พอเปียก ใส่แกัริดสีดวงทวารหนัก ใส่แกัโรคผิวหนังต่าง ๆ”

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๓ ชนิด รวมน้ำหนัก ๖๐ กรัม ดังนี้

ลำดับ	ตัวยา	น้ำหนักยา(กรัม)
๑	ขมิ้นชัน	๑๕
๒	ใบกัญชา	๑๕
๓	น้ำมันเมล็ดฝ้าย	๓๐

- ประกอบด้วยตัวยา ๓ ชนิด รวมน้ำหนัก ๓๐ กรัม
 - ตำรับนี้มีกัญชาเท่ากับขมิ้นชัน จึงเป็นตัวยาหลัก
- ทารักษาหัวริดสีดวงทวารหนัก รักษาโรคผิวหนัง
- Inflamed hemorrhoid, Skin inflammation, Dermatitis
- ข้อบ่งใช้
 - ทแกัริดสีดวงทวารหนัก และทาแกัโรคผิวหนัง (เช่น เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก)
- รูปแบบยา
 - ยาน้ำมัน
- ขนาดและวิธีใช้
 - ทาวันละ ๒ ครั้ง หลังอาบน้ำเช้าและเย็น
- ข้อห้ามใช้
 - -
- ข้อควรระวัง
 - ควรระวังการใช้กับผู้ที่มีแพ้ส่วนประกอบของตำรับ

ตำรับยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง

ตำรับนี้ดีต่อแผลผุุดจากโบราณโรคเช่น **ผื่นภูมิแพ้, แผลเรื้อรัง, แผลสะกิดเงิน**

- รสประธานตำรับยา: รสร้อนสุขุม
- รสของตำรับยา: รสร้อนออกรสมัน มีรสเมาเบื่อแทรก
- สรรพคุณตำรับ: แก้พิษเสมหะที่ผุดทางตะไคร้ผ่านทางบุพโพ โลหิตั่ง แก้ฝีผุดภายนอกอันเกิดแต่เสมหัง บุพโพ โลหิตั่งแก้กลุ่มอาการผื่นคัน ผื่นอักเสบอันเกิดแต่การสะสมตัวของกรีสะในกรีสั่งในบุพโพ โลหิตั่งนั้น

ตำรับยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง

วิธีใช้ยา:

- ทายาให้ทั่วบริเวณที่เกิดผื่นหรือฝีผุดขึ้น
- ในหนึ่งวันไม่ควรทายาเกินกว่า 5 ครั้ง
- ไม่ควรทายาติดกัน ควรเว้นช่วงห่างอย่างน้อยหนึ่งกालในหนึ่งวัน
- ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยใหม่



ข้อห้าม:

- แผลที่มีกำเดาสันตັปปักคืกำเริบ(อักเสบ บวมแดง)
- แผลที่เปิดถึงมั่งสัง นหารู อัญฐิ (ใช้ได้ดีในกลุ่มอาการที่ผุดขึ้นทางตะโจเท่านั้น)
- ห้ามปิดแผลผุดนั้นให้เปิดไว้เป็นปกติ

ข้อพึงระวัง:

- เมื่อทายาแล้วไม่ควร แกะหรือเกาบริเวณที่มีอาการผุดขึ้นนั้นเป็นอันขาด

แผนภูมิที่ 17 แนวทางการใช้ยาหาโรคสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง

สิ่งที่พบบ่อย



ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยอาการโรคสีดวงทวาร
หนัก เรื้อนกวาง เรื้อนมูลนก

ซักประวัติและตรวจร่างกาย เพื่อวางแผนการ
รักษาทางการแพทย์แผนไทย

พิจารณาจ่ายยาหาโรคสีดวงทวารหนักและโรค
ผิวหนัง เป็นเวลา 7 - 15 วัน

ดีขึ้น
ไม่ดีขึ้น

พิจารณาแนวทางการรักษาอื่น

ประเมินผลและติดตามการรักษาต่อเนื่อง

พิจารณาหยุดการรักษา เมื่ออาการของ
โรคโดยรวมปกติโดยไม่ต้องใช้ยา

รูปแบบของยา เป็นผงและน้ำมัน

ใช้แล้วมักมีอาการระคายเคือง

ใช้ได้ดีในแผลเปิดที่มีการอักเสบเรื้อรัง

มักไม่ได้ผลในกลุ่มสะเก็ดเงินที่อยู่ในระยะตกสะเก็ด

ทาบริเวณริดสีดวงทวาร แล้วมีอาการระคายเคืองค่อนข้างมาก

จึงต้องใช้น้ำมันเมล็ดฝ้ายมากกว่าผงยาถึง 3 เท่า



ยาอัมฤตย์โอสถ

ที่มาของตำรับยา แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.
ศ. ๑๒๖

“ขนานหนึ่งชื่ออัมฤตย์โอสถ แก้วมไภษยทั้งปวงเอา สหีสกุน ๑ แก่น
แสมทะเล ๑ รากส้มกุ้ง ๑ ลูกมะตูม ๑ ลูกมะແหน ๑ ลูกพิลังกาสา ๑ สมอเทศ ๑
สมอไทย ๑ โกฏเขมา ๑ เทียนดำ ๑ เทียนขาว ๑ ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑
กระวาน ๑ กานพลู ๑ คีปติ ๑ ยาทั้งนี้เอาสมอภาค เอาเปลือกหอยโข่ง ๑
เปลือกหอยขม ๑ เปลือกหอยแครง ๑ เบี้ยผู้เผา ๑ เอาสิ่งละ ๑ ส่วน เอากันชา



๑๐ ส่วน เอาพริกไทย ๒ เท่ายาทั้งหลาย ตำผงกระสายยักย้ายใช้ให้ชอบโรค
ทั้งหลายเกิด ตำราหลวง ๒ ขนานเท่านั้นแล”

สูตรตำรับยา ประกอบด้วยตัวยา ๒๒ ชนิด รวมน้ำหนัก ๙๖ ส่วน
สรรพคุณ แก้ลมกษัยทั้งปวง

รูปแบบยา ยาผง

เอกสารอ้างอิง พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สุภการจารูญ ถนนอิสรภาพ; ร.ศ.๑๒๖. หน้า
๓๖๘.



สหัสคุณ แก่นเสมทะเล รากส้มกุ้ง ลูกมะตูม สมอพิเภก พื้งกาสา
สมอเทศ สมอไทย โกจิเขมา เกียนดำ เกียนขาว ลูกจันทน์ ดอก
จันทน์ กระวาน กานพลู ดีปลี เปลือกหอยโข่ง เปลือกหอยชม
เปลือกหอยแครง เบี้ยผู้เฒ่า **กัญชา** พริกไทย

ตำรับยาอัมฤตย์โอสถ จากตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 126

มีตัวยา 22 ชนิด

– ขอบ่งใช้: แก้กลมกษัย

– ขนาดรับประทาน/วิธีการใช้ ที่แนะนำ: รับประทานครั้งละ 2 กรัม(1ซอง) วันละ 2 ครั้ง

ก่อนอาหารเช้า-เย็น ใช้น้ำต้มสุกเป็นน้ำกระสายยา



ตำรับยาอัมฤตโอสถ *



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ตำรับยานานนี้ดีต่อเธอเปรี้ยวที่เป็นโบราณโรคจนเข้าเขต **กระษัยทัน**

และใช้เป็นตำรับยาล้อมในอาการ **กระษัยลิ้นกระบือ**

- รสประธานตำรับ : รสร้อน สุขุม
- สรรพคุณตำรับ : แก้อาการกรดไหลย้อนออกเธอเปรี้ยว ลดอาการจุกเสียด แน่น จากที่รูปธาตุลมเคลื่อนตัวได้ช้าเบื่ออาหาร รับประทานอาหารได้น้อย ทำให้เจริญอาหารแก้ลมกษัย ลมกล่อน ลมเถา
- วิธีรับประทาน : ให้รับประทานหลังมื้ออาหาร **ไม่เกินเพียงครึ่ง** ต่อมื้ออาหาร



ตำรับยาอัมฤตโอสถ *



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ข้อห้าม

- ในผู้ไข้มีกำเฒ่าย่อย และกำดาสันตูปักคืกำเริบอยู่
- ในผู้ไข้มีครรภ์นัปปฎิสนธิ
- ในผู้ไข้มีอาการโลหิตตีขึ้นบน
- ในผู้ไข้ที่มีอาการสัตะกะวะตะกำเริบมีอาการเสียด
เข้าหทัยวัตฤ
- ในผู้ไข้มีอาการทางพิษปิตตะกำเริบเป็นสมุฏฐานทุกๆ
อาการ

ข้อพึงระวัง

- ระวังความร้อนอันอาจเกิดขึ้นจากรสประธานของตำรับยา
- ในผู้ไข้มีจักราศีลงรูปธาตุไฟ เพราะมีปกติที่ธาตุไฟกำเริบได้ง่าย
- ระวังอาการข้างเคียงอื่นๆอันอาจเกิดขึ้นจากตัวยารสเมาเบื่อที่มีมากในตำรับ
 - รูปธาตุดิน อาจกระทบการทำงานของระบบมัตถลุงคังได้ และทำให้ระบบหายใจตันเร็วขึ้น
 - รูปธาตุน้ำ อาจทำให้ท้องผูก ถ่ายยาก หรือมีอาการท้องเสียสลับ
 - รูปธาตุลม อาจทำให้เกิดอาการอุจจิมาวาตากำเริบขึ้น
 - รูปธาตุไฟ อาจกำเริบขึ้นให้ตัวร้อนกายรุ่ม มีอาการไฟระส่ำระสาย
 - อาจทำให้ง่วงเหงาหาวนอนได้ ถ้าง่วงให้นอน
 - ตำรับยานี้แพทย์ต้องวางยาด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หมั่นแลผลข้างเคียงให้จงดีด้วย

ใช้กัญชาถึง 10 ส่วน

ยาไฟอาวุธ



ยาชื่อไฟอาวุธขนานนี้ เอาผลจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ โกศทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ ชะเอมเทศ ๑ กัญชา* ๑ แก่นแสมทะเล ๑ เอาสิ่งละ ๑ ส่วน อุตพิต ๑ เปลือกสมุลแว้ง ๑ ดีปลี ๑ ใบพิมเสน ๑ เอาสิ่งละ ๒ ส่วน ราก จิงจ้อ ๑ รากส้มกุ้ง ๑ รากเปล้าน้อย ๑ รากเปล้าใหญ่ ๑ รากสะค้าน ๑ รากพาชไนน์ ๑ เอาสิ่งละ ๓ ส่วน สหัตถ์คุณเทศ ๔ ส่วน บุกรอ ๙ ส่วน พริกไทย ๑ ขิงแห้ง ๑ รากเจตมูล ๑ เอาสิ่งละ ๑๖ ส่วน รวมยา ๓๒ สิ่งนี้ทำเป็นจุน เอาน้ำมะนาวเป็น กระสายบดทำแท่งไว้ กินแก้ทราง ๗ จำพวก แก้ตานโจรทั้ง ๑๒ จำพวก แก้หิดน้ำนมทั้ง ๗ จำพวก แก้ไผอมเหลือง แล แก้ไส้พองท้องใหญ่ แก้พุลงโรแลลมจุกเสียด แลแก้ป้างแก้ม้ามแก้ดานเสมหะให้ปวดมวนเสียดแทง แก้อุจจาระเป็นเสมหะ โลหิตระคนกันมักให้ถอยกำลัง มักให้เป็นไข้ไม่รู้สีกตัวให้ลงเป็นโลหิต แก้ไข้เพื่อเสมหะเพื่อลม”

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตำรายา 32 ชนิด รวมน้ำหนัก 104 ส่วน



ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู โกฐสอ โกฐเขมา
โกฐหัวบัว โกฐจุฬาลัมพา โกฐเชียง เกียนดำ เกียนขาว
เกียนแดง เกียนขาวเปลือก เกียนตาตึกแตน ชะเอมเทศ
กัญชา แสมทะเล อุดพิศ สมุลแว้ง ดีปลี ใบพิมเสน จิงจ้อ
ส้มกุ่ม เปล้าน้อย เปล้าใหญ่ สะค้าน พาชไหนด สหสคุณเทศ
บุนนาค พริกไทย ขิงแห้ง เจตมูลเพลิง

ตำรับยาไฟอาวุธ จากตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 128

มีตัวยา 32 ชนิด

- ขอบ่งใช้: แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง แก้ตามเสมพะ แก้ท้องมาน
- ขนาดรับประทาน/วิธีการใช้ ที่แนะนำ: รับประทานครั้งละ 2 - 4 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น ใช้น้ำมะนาว/น้ำต้มสุกเป็นน้ำกระสายยา



ยาไฟอาวุธ



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ตำรับนี้แก้พิษเสมหะ-วตะ ใช้ไฟเป็นอาวุธประหารโรคทางปฐโป โลหิตตั้ง

- **รสประธานตำรับยา:** รสร้อนสุขุม
- **สรรพคุณตำรับ:** บรรเทา**อาการทางลม**ที่ทำให้จุกเสียด แน่นท้อง **มวนท้อง** ไช้ร້ท้อง หนองท้องน้อยแก้อาการไส้พองท้องใหญ่ จากรูปธาตุลมและน้ำแก้อาการผอมแห้งแต่พุงโรก้นปอดช่วยถ่ายพิษเสมหะ แก้ก้านเสมหะ แก้อุจจาระเป็นมูกเลือดแก้ป้าง แก้ม้ามแก้ภาวะอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง จากพิษเสาะหะ แก้อไให้ผอมเหลือง จากพิษเสมหะเช่นกัน แก้อาหวะ แก้ก้านโจร แก้อึดน้ำนม



ยาไฟอาวุธ



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

วิธีรับทาน:

- ไม่ควรทานยาเกินกว่า หนึ่งเฟื้อง-หนึ่งไพต่อครั้งรับทาน
- ให้รับทานก่อนมื้ออาหาร
(**น้ำมันาว เป็นกระสายรับทานไปพร้อมกับยา**)**
- ในหนึ่งวันไม่ควรรับทานเกินกว่า หนึ่งสลึง-สองไพ
- ไม่ควรรับทานติดกัน ควรเว้นช่วงห่างอย่างน้อยหนึ่งกาลในหนึ่งวัน

ข้อห้าม:

- ในผู้ไข้มีกำเฒ่าสันตูปัศคิกำเริบ
- ในผู้ไข้มีครรภ์นับแต่ปฏิสนธิ
- ในผู้ไข้ที่มีอาการสัตะกะวาทะกำเริบมีอาการเสียดเข้าหทัยวัตถุ
- ในผู้ไข้มีอาการทางพิษปิตตะกำเริบเป็นสมุฏฐานทุกๆอาการ

ข้อพึงระวัง:

- ระวังความร้อนอันอาจเกิดขึ้นจากรสประธานของตำรับยา
- ในผู้ไข้มีจักราศีลงรูปธาตุไฟ เพราะมีปกติที่ธาตุไฟกำเริบได้ง่าย
- ระวังความร้อนอันอาจเกิดขึ้นจากรสประธานร้อนของตำรับยา
- ในผู้ไข้มีจักราศีลงรูปธาตุไฟ เพราะมีปกติที่ธาตุไฟกำเริบได้ง่าย

ตำรับยาแก้นอนไม่หลับ(ยาแก้ไข้ผอมเหลือง) *



สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตำรายา ๘ ชนิด รวมน้ำหนัก ๑๖ ส่วน ดังนี้

ลำดับ	ตำรายา	น้ำหนักยา
๑	ขิงแห้ง	๑ ส่วน
๒	พริกไทยล่อน	๒ ส่วน
๓	ดีปลี	๑ ส่วน
๔	จันทน์แดง	๑ ส่วน
๕	จันทน์ขาว	๑ ส่วน
๖	ใบสะเดา	๑ ส่วน
๗	ใบคนทีเขมา	๑ ส่วน
๘	ใบกัญชา	๘ ส่วน





ตำรับยาแก้นอนไม่หลับ(ยาแก้ไข้ผอมเหลือง) *



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ตำรับนี้ใช้ลดปวดตึงที่กำเริบ แลใช้กับโบราณโรคในช่องอุตเสมหะทั้งปวง

- รสประธานตำรับยา: รสสุขุม ติดจะร้อน สุขุมร้อน
- สรรพคุณตำรับ: แก้ไข้ให้ผอมให้เหลือง ดุจเข้าดีให้ชานไปในโลหิต ตัวสั่น เสียงสั่น ตั้งสันนิบาตลูกนกไม่มีกำลั้ง อ่อนเพลีย ด้วยดีที่ชานนั้นนอนไม่หลับ ด้วยพิษวาตะกระทำ
- วิธีรับทาน: ไม่ควรทานยาเกินกว่า หนึ่งเฟื้องต่อครั้งรับทาน ให้รับทานตามกาลสามก่อนมื้ออาหาร
- (น้ำมะพร้าวผสมน้ำส้มซ่า ต้มรวมกับเหง้ากระทือ แต่งรสด้วยน้ำผึ้งและน้ำตาลทราย เป็นกระสายรับทานไปพร้อมกับยา)ในหนึ่งวันไม่ควรรับทานเกินกว่า หนึ่งสิ่งไม่ควรรับทานติดกัน ควรเว้นช่วงห่างอย่างน้อยหนึ่งกาลในหนึ่งวัน



ตำรับยาแก่นอนไม่หลับ(ยาแก้ไข้ผอมเหลือง) *



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ข้อห้าม:

- ในผู้ที่มีกำเริบไตหรือตับ
- ในผู้ที่มีครรภ์หรือให้นมบุตร

ข้อพึงระวัง:

- ระวังอาการข้างเคียงอื่นๆอันอาจเกิดขึ้นจากตัวยาเสมอเพื่อที่มียาในตำรับ
 - รูปธาตุดิน อาจกระทบการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด และทำให้ระบบหายใจตื้นเร็วขึ้น
 - รูปธาตุน้ำ อาจทำให้ท้องผูก ถ่ายยาก หรือมีอาการท้องเสียสลับ
 - รูปธาตุลม อาจทำให้เกิดอาการอึดอัดแน่นท้อง
 - รูปธาตุไฟ อาจกำเริบขึ้นให้ตัวร้อนกายรุ่ม มีอาการไฟระส่ำระสาย
 - ตำรับยานี้แพทย์ต้องวางยาด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หมั่นแลผลข้างเคียงให้จงดี ด้วยใช้ใบกัญชาถึง 8 ส่วน



ยาแก้โรคจิต *

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตำรายา ๑๔ ชนิด รวมน้ำหนัก ๕๗๐ กรัม ดังนี้

ลำดับ	ตำรายา	น้ำหนักยา(กรัม)
๑	เปลือกกุ่มน้ำ	๓๐
๒	เปลือกมะรุม	๔๐
๓	แห้วหมู	๑๕
๔	เปล้าน้อย	๑๕
๕	เปล้าใหญ่	๑๕
๖	รางแดง	๑๕
๗	จันทน์เทศ	๑๕
๘	เปลือกมะตูม	๑๕
๙	ก้านกล้วยชา	๑๕
๑๐	บอระเพ็ด	๑๕
๑๑	เปลือกโมกมัน	๑๕
๑๒	หญ้าชันกาด	๑๕
๑๓	สนเทศ	๑๕
๑๔	ระย่อม	๒๘๕



แก้โรคจิต

ยาแผนไทย

แก้โรคลมที่ทำให้กั้ววล
เครียด นอนไม่หลับ


อาจาโร เอิร์บ
Ajaro Herb



ยาแก้โรคจิต *



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

**ตำรับนี้มีแรงโอสถสารมาก สำหรับผู้ใช้ที่มีอาการทางนามรุนแรง หรือได้รับยาจิตเวชมาอย่างยาวนาน
และต้องการลดผลข้างเคียงของยาจิตเวชลง ลางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่งดุจผีเข้าสิง**

- รสประธานตำรับ : สุขุมเย็น
- สรรพคุณตำรับ : **ลดความวิตกกังวล ภาวะเครียด ที่ทำให้เกิดปรััยหคคื ระบบความร้อนจก
ระส่ำระสายไปลดอาการปวดหัว หรือปวดหัวข้างเดียว ที่เกิดจากนาม หมายคามเครียด ความ
วิตกกังวล**
- ลดอาการโลหิตตีขึ้นบน อันมาจากนามนั้น
- ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้จิตประสาทหย่อนลงสงบขึ้น
- ช่วยให้รู้สึกรื่นเริญอาหาร



ยาแก้โรคจิต *



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

วิธีรับประทาน :

- ให้รับประทานก่อนนอนครั้งละ สองไฟ-หนึ่งสลึง หรือ เมื่อมีความเครียดมาเยือน แต่ห้ามรับประทานเกินกว่าวันละ 1 สลึง

ข้อห้าม

- ในผู้ที่มีกำเริบและกำดาสันตัมปคคิกำเริบอยู่
- ในผู้ที่มีครรภ์นั้บปฏิสนธิ
- ในผู้ที่มีอาการโลหิตตีขึ้นบน
- ในผู้ที่มีอาการสั้ตตะกะวะตะกำเริบมีอาการเสียดเข้าหทัยวัตถุ
- ในผู้ที่มีอาการทางพิษปิดตะกำเริบเป็นสมุฏฐานทุกๆ อาการ

ข้อพึงระวัง

- ระวังอาการข้างเคียงอื่นๆ อันอาจเกิดขึ้นจากตำรับยา เช่น อาการมึนงง ศีรษะ คลื่นเหียนอาเจียน ใจสั่น และอาจทำให้หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอเกิดอันตรายได้
- ระวังอาการข้างเคียงอื่นๆ อันอาจเกิดขึ้นจากตำรับยา
- - **รูปธาตุดิน** อาจกระทบการทำงานของระบบมัตถลุงคังได้ และทำให้ระบบหทยังเต้นเร็วขึ้น
- - **รูปธาตุน้ำ** อาจทำให้ระบบปิกังทำงานมากขึ้น ระวังการใช้ในผู้ใช้ที่มีโรคเกี่ยวกับไต
- - **รูปธาตุลม** อาจทำให้เกิดลมอุ้งคมาวตากำเริบขึ้น
- - **รูปธาตุไฟ** อาจทำให้ตัวผู้ที่มีอาการรุ่มๆเหมือนมีไข้ จากไฟที่ระส่ำระสายไป
- - ตำรับยานี้แพทย์ต้องวางยาด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หมั่นแลผลข้างเคียงให้จงดี ด้วยใช้ราระย้อมเท่าด้วยยาอื่นๆรวมกัน



ยาแก้โรคจิต *



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

• กลุ่มน้ำ

- เปลือกต้นรสขมหอม แก้วฮัก ขั้วฝายลม ขั้วเหงื่อ แก้วในกองลม แก้วกระษัย แก้วริดสีดวงผอมแห้ง ดับพิษที่ผิวหนัง แก้วไข่ ขั้วน้ำเหลืองเสีย ขั้วน้ำดี ขั้วนิ่ว แก้วอาเจียน แก้วลมทำให้เรอ

• กลุ่มบก

- เปลือกต้นรสร้อน ขั้วลม แก้วปวดท้อง แก้วท้องอืด คุมธาตุ ขั้วฝายลม แก้วบวม บำรุงธาตุ กระตุ้นลำไส้ให้ย่อยอาหาร บำรุงหัวใจ ทาแก้โรคผิวหนัง เป็นยารงับประสาท

• มะรุม

- เมล็ดรสจืดมัน แก้วไข่ ตำพอกแก้ปวดตามข้อ แก้วบวม
- เปลือกต้นรสร้อนเผื่อน ขั้วลมในลำไส้ ทำให้ฝายเรอ แก้วลมขึ้น

• โมกมัน

- เปลือกต้นรสขมร้อนฝาดเมา บำรุงธาตุทั้ง ๔ ให้เจริญ รุ้ปีธา

• มะตูม

- เปลือกกราก, ลำต้น รสฝาดปร่าขื่น แก้วจับลิ้น ขั้วลมในลำ

• ระย่อม

- รากรสขมเมา แก้วพิษกาฬ แก้วป้างเพื่อดีและโลหิต รัชรับประสาทเนื่องจากดีและโลหิต แก้วความดันโลหิตสูง แก้วไข่ เจริญอาหาร

• ประกอบด้วยตัวยา ๑๔ ชนิด รวมน้ำหนัก ๓๘ บาท

- ตำรับนี้ใช้ ก้านกล้วย ๑ ใน ๓๘ ส่วน หรือประมาณร้อยละ ๒.๖ จึงเป็นตัวยาประกอบ

• ลดความวิตกกังวล ลดความเครียด ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น

• Sleep disorder: Anxiety disorder, Insomnia

- ตำรับนี้ต้องระวังในการกินยาปริมาณมากหรือกินต่อเนื่องในระยะเวลาาน เนื่องจากระย่อมมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตและอาจจะส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาท ทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ ปากแห้ง คัดจมูก ท้องร่วง มึนงง หน้ามืด ใจสั่น ซึม มือแขนสั่น

ตำรับยาอัคคีนิวคณะ



สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตำรายา ๑๐ ชนิด รวมน้ำหนัก ๒๗ ส่วน ดังนี้

ลำดับ	ตำรายา	น้ำหนักยา
๑	กัญชา	๑ ส่วน
๒	ยี่งสม (โสม)	๑ ส่วน
๓	เปลือกอบเชย	๒ ส่วน
๔	ใบกระวาน	๒ ส่วน
๕	กานพลู	๒ ส่วน
๖	สะค้าน	๒ ส่วน
๗	ขิงแห้ง	๓ ส่วน
๘	เจตมูลเพลิง	๔ ส่วน
๙	ดีปลี	๔ ส่วน
๑๐	น้ำตาลกรวด	๖ ส่วน



ตำรับยาอัคคีนิวกณะ



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ตำรับนี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุทำให้รูปมีเรียวแรงขึ้น ถือเป็นตำรับยาอายุยืนผู้สูงวัยได้

- รสประธานตำรับยา: **รสร้อนมาก**
- สรรพคุณตำรับ บรรเทาอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง จนอ่อนระโหยโรยแรง พาลให้อ่อนกายแลอ่อนใจ ช่วยรักษาอาการแขน ขา ไม่มีกำลังบำรุงมั่งสั่งให้บริบูรณ์ แต่ไม่อ้วน ที่อ้วนอวบอาจทำให้น้ำหนักลดลง ได้แก้อาการจุกเสียดแน่นท้องจากรูปธาตุลมที่เคลื่อนตัวได้ไม่ดีในผู้ป่วยติดเตียง ผู้ใช้อันธพฤษก์ อันธพาด ผู้ที่เคลื่อนไหวน้อยให้ขัดแข้งขัดขาช่วยจุดปรีณามัคคี ชะลอชีรณัคคี



ตำรับยาอัคคีนิวคณะ



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

วิธีรับทาน:

- ไม่ควรทานยาเกินกว่า หนึ่งสลิ้ง-หนึ่งไฟต่อครั้งรับทาน
- (กระสายเป็นน้ำข้าวเช็ด 1 แก้วเจือเกลือกกับน้ำตาลกรวด/น้ำผึ้ง รับทานไปพร้อมกับยา)
- ในหนึ่งวันไม่ควรรับทานเกินกว่า สองสลิ้ง-สองไฟ
- ไม่ควรรับทานติดกัน ควรเว้นช่วงห่างอย่างน้อย หนึ่งกาลในหนึ่งวัน

ข้อห้าม:

- ในผู้ไข้มีภาวะกำเเดาสันตูปคคีสูง
- ในผู้ไข้มีครรภ์นับแต่ปฏิสนธิ
- ในผู้ไข้มีภาวะโลหิตตีขึ้นบน
- ในผู้ไข้ที่มีโรคเบาหวานเรื้อรัง
- ในผู้ไข้หทัยวัตถุพิการ

ข้อพึงระวัง :

- ระวังความร้อนสูงมากอันอาจเกิดขึ้นจากรสประธานของตำรับยาที่ร้อนมาก
- ในผู้ไข้มีจักราศีลงรูปธาตุไฟ เพราะมีปกติที่ธาตุไฟกำเริบได้ง่าย
- ห้ามรับทานติดต่อกันนานเกินกว่า 4 วัน รูปธาตุไฟอาจกำเริบขึ้นได้ ให้หยุดสักพักพอคลายความร้อนลงถึงเริ่มทานใหม่ได้ แต่ห้ามรับทานต่อเนื่องกัน
- อาจหิวน้ำบ่อยๆให้เพียงจิบดับกระหาย ห้ามน้ำเย็นทุกชนิดให้รับทานน้ำอุณหภูมิปกติ

• ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง



• ที่มาของตำรับยา : ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

- ยาแก้ลมขึ้นสูง เอายาดำ, **กัญชา**, อุตพิต, ดองดึง สิ่งละ ๔ ส่วน กระเทียม ๖ ส่วน, ว่านน้ำ, ชะเอมเทศ โกงฐน้ำเต้า, โกงฐพุงปลา, มหาหิงค์ สิ่งละ ๘ ส่วน ว่านเปราะ, ผลผักชี สิ่งละ ๑๒ ส่วน ขิงแห้ง, แก่นแสมทะเล รากส้มกุ่ม, สะค้าน สิ่งละ ๑๖ ส่วน พริกไทย, เปลือกกันเกรา สิ่งละ ๒๔ ส่วน ทำเป็นจุนบด ละลายน้ำผึ้งรวง ให้กินหนัก ๑ สลึง แก้ลมขึ้นสูงหายตีนัก ฯ”

• สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๑๘ ชนิด รวมน้ำหนัก ๑๙๘ ส่วน

• ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง



- ๑ สิทธิการิยะ จะกล่าวด้วยตำรายาคือวิเศษสรรพคุณสำเร็จ อันอาจารย์เจ้าในก่อนประมวลไว้ ให้แก้สรรพโรคทั้งปวงต่าง ๆ สบกนมา ฯ
- ในที่นี้จะว่าแต่สรรพคุณวิเศษ คือคณะสรรพยาที่จะแก้ซึ่งโรคสรรพลมทั้งปวงอันกำเริบพัดขึ้นเบื้องบนนั้นโดยนัยดังนี้ ฯ

- คำอธิบาย : ลมขึ้นเบื้องสูงหมายถึงลมที่พัดจากฝ่าเท้าฝ่าขึ้นกกหูขึ้นเหนือหูเรียกว่าลม สักกะวาตะ ให้หาว่าให้เรือ ให้เจ็บอก จุกชุมว่าเจ็บศีรษะกินไม่ได้นอนไม่หลับ เข้าสู่กระดูกหม่อมเรียกว่า ลมอัศฎากาส ทำให้หมดสติ ลมย้อนกลับเป็นลมจันทรจากไรผมกลางหน้าผากลงหัวคิ้ว เขารากตาช่วยให้ตาสว่าง เข้าสู่เพดานลงรากลิ้นย้อนกลับตามขากรรไกร เป็นลมชีวหาสดมภ์และมหาสดมภ์ ให้หาว่าเรือ แล้วลงสู่ขั้วหัวใจ เป็น ลมหทัยวาตะ ลมนี้เกิดขึ้นให้มันตึง ใจลอย เจริญไม่ออก ใจน้อยขี้โกรธ เตียวหัวเราะเตียวร้องไห้แก้เข้าจะเป็นลมบาดทะจิต ถ้ามล สุนาติขึ้นปะทะ ไฟกับลมรวมกัน จับลิ้นแข็ง ลมเขาราก ลิ้นทำให้ เหนื่อยหอบ ลมมีกำลังมาก อัดแน่น ทำให้ เป็นสาเหตุของเส้นเลือดในสมองแตก

- สรรพคุณ แก้ลมขึ้นเบื้องสูง
- รูปแบบยา ยาผง
- ขนาดและวิธีการใช้รับประทานครั้งละ ๑ สติง ละลายน้ำผึ้ง



ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย

ที่มาของตำรับยา ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

"เอากัญชา ๑, ดีปลี ๑, พริกไทย ๑, ขิงแห้ง ๑, ขอบชะนางทั้ง ๒, ตานหม่อน ๑, ลูกจันทน์ ๑, ดอกจันทน์, สมุลแว้ง ๑, อบเชย ๑, กานพลู ๑, เอาเสมอภาค ทำเป็นจุนบดละลายน้ำผึ้งกินหนัก ๑ สลึง ให้กินเข้าเย็น อาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าให้กิน ๗ วันหายวิเศษนัก ฯ "

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตำยา ๑๒ ชนิด รวมน้ำหนัก ๑๒ ส่วน

แก้ลมเนาวนารีวาโย
ยาแผนไทย

แก้ลมเนาวนารีวาโย

แก้ลมเนาวนารีวาโย

แก้ลมเนาวนารีวาโย

แก้ลมเนาวนารีวาโย

แก้ลมเนาวนารีวาโย

แก้ลมเนาวนารีวาโย

แก้ลมเนาวนารีวาโย

แก้ลมเนาวนารีวาโย

แก้ลมเนาวนารีวาโย



Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ขนาดและวิธีการใช้ รับประทานครั้งละ ๑ สิ่ง ละลายน้ำผึ้ง
วันละ ๒ ครั้ง เช้า-เย็น (รับประทาน ๗ วันหาย)

ยาแก้สันทฆาต กร่อนแห้ง

ที่มาของตำรับยา แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๖

ยาแก้โรคสำหรับบุรุษชานานนี้ เอาเถาสะค้าน ๑ ผักแพวแดง ๑ หัวดองดึง ๑ ว่านน้ำ ๑ มหาหิงค์ ๑ เนื้อในฝักราชพฤกษ์ ๑ โกฐสอ ๑ โกฐพุงปลา ๑ โกฐจุฬาลัมภา ๑ **กันชา ๑** หัวอุตพิต ๑ ชะเอมเทศ ๑ ดีปลี ๑ แก่นแสมทะเล ๑ ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค พริกไทยกึ่งยา แต่ว่าผ่อนตามกำลัง ทำผงแล้วเอาน้ำใบกะเม็ง ๑ น้ำผลประคำดีควาย ๑ เอาเทำกันเคล้ายาให้ได้ ๗ ครั้ง ผึ่งให้แห้งแล้วบดกับน้ำผึ้งรับประทาน หน้า ๑ สลึง แก้โรคดังกล่าวมาแล้วแต่หลัง”

สูตรตำรับยา ประกอบด้วย ตัวยา ๑๕ ชนิด รวมน้ำหนัก ๒๑ ส่วน



ยาแก้สันทฆาต กร่อนแห้ง



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

“จะว่าด้วยโรคสำหรับบุรุษหรือสตรีก็เหมือนกัน แต่จะว่าด้วยบุรุษนั้นก่อน ถ้าผู้ใดเป็นโทษสันทฆาตกล่อนแห้งมักให้ผูกพรวดิกแล
ลมเสียดแทง ให้เป็นลูกเป็นก้อนเป็นดานในท้องให้เมื่อยขบทั่วสารพวงค์ มักให้เจ็บบั้นเอว ให้มือเท้าตายเป็นเหน็บชา มักขัดหัวเหน่า
น่าตะโพก ตึงสองราวข้างไปจนตลอดทวารหนัก ปัสสาวะเป็นโลหิตให้ปวดสีสะวิงเวียนหน้าตา ปากเปื่อยตาแหกเสียงแห้งเจรจาไม่มีใคร
ได้ยิน จักษุมืดหูหนวก แลจุกเสียดท้องขึ้นแน่นน่าอก เสพย์อาหารไม่มีรส โรคทั้งนี้เป้นเพื่อวาตะ, เสมหะ, โลหิต, กำเริบ เมื่อจะเป้นนั้น
ให้หมั้นเนื้อตัวแลอาหารถอย บางทีให้จับสับตร้อนสท้านหนาว มักอยากของเปรี้ยวหวานแลเย็น เป้นทั้งนี้เพราะโลหิตแห้งติดกระดูก
สันหลัง บุรุษแลสตรีเป้นเหมือนกันจะแก้ท่านให้แต่งยานี้

สรรพคุณ

แก้สันทฆาต กล่อนแห้ง

รูปแบบยา

ยาผง (ทำผงแล้วเอาน้ำใบกะเม็ง น้ำผลประคำดีควายเอาเท่ากัน เคล้ายาให้ได้ ๗
ครั้ง ผึ่งให้แห้ง)

ขนาดและวิธีการใช้

รับประทานครั้งละ ๑ สลึง ละลายน้ำผึ้ง

ยาทัพยาธิคุณ

ที่มาของตำรับยา คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม ๒

“ยาชื่อทัพยาธิคุณ เอาสะค้าน ผักแพวแดง ดองดิง หวานน้ำ ยาดำ มหาหิงค์
โกฐสอ โกฐจุฬาลำพา โกฐพุงปลา **กัญชา** หัวอุตพิต เนื้อฝักราชพฤกษ์ ชะเอมเทศ
ดีปลี แก่นแสมทะเล เอาสิงละ ๑ ส่วน พริกไทยล่อนเท่ายาทั้งหลาย ตำเป็นผง เอาน้ำ
ใบกำมะหยี่ น้ำลูกประคำดีควาย เคล้ายาผงตากแดดให้แห้งสิงละ ๗ ครั้ง แล้วบดด้วย
น้ำผึ้งกินหนัก ๑ สลึง”



ยาทัพยาธิคุณ



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

สรรพคุณ แก้ก้อน ๕ ประการ แก้มเป็นก้อนในอุทร ให้เจ็บทั่วร่างกาย เจ็บสะเอว มือเท้าตาย กระจ่างแลเมื่อยขบทุกข้อทุกลำ ขัดแข้งขา เจ็บทวารหนัก เบาพิการต่าง ๆ เจ็บศีรษะเวียนหน้าตา เจ็บ ไหล่ทั้งสอง ปากเปรี้ยว เสียงแหบแห้ง ขัดสีข้าง ขัดอก ท้องขึ้น กินอาหารไม่มีรส นอนไม่ใคร่หลับ โรค ทั้งนี้เป็นเพราะเสมหะแห้ง บุรุษและสตรีเป็นเหมือนกัน

สรรพคุณ

แก้ก้อน ๕ ประการ

รูปแบบยา

ยาผง (ทำเป็นจุน เกลี้ยยาด้วยน้ำใบกะเม็ง น้ำลูกประคำดีควาย ตากให้แห้งสิ่ง ละ ๗ ครั้ง)

ขนาดและวิธีการใช้

รับประทานครั้งละ ๑ สลึง ละลายน้ำผึ้ง



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

- โรคภัยร่อนเป็นโรคความเสื่อมเรื้อรังที่เชื่อมโยงแสดงอาการในหลายระบบเกี่ยวข้องกัน เช่น ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทกล้ามเนื้อ
- ตำรับยาผีฟ้าเป็นตำรับยาหลักสรรพคุณขยายหลอดเลือดกระจายเลือดไหลเวียนทั้งร่างกาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยล้า
- ตำยารองมีแก่นสมทะเลรักษาอาการลมในเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ มีตำยาโกษฐ์และว่านน้ำที่ช่วยเรื่องการทำงานของระบบลำไส้และกระจายลม มียาบรรยายพิษในลำไส้ ทั้งหมดช่วยเรื่องลมในเส้นและกระจายเลือดลม
- ช่วยบรรเทาอาการจากเรื่องการทำงานของเส้นประสาทส่วนปลายที่เสื่อมเรื้อรัง
- แต่อาการจากมะเร็งระดับที่ทำให้มือเท้าบวมน่าจะยังต้องพิจารณาข้อบ่งชี้ให้ดี

- ประกอบด้วยตำยา ๑๒ ชนิด รวมน้ำหนัก ๓๐ ส่วน
 - ตำรับนี้มีกัญชา ๑ ใน ๓๐ ส่วน หรือประมาณร้อยละ ๓.๓๓ จึงเป็นตำยาประกอบ
- แก้อาการปวดตึงตามเส้น ท้องอืดจุกเสียดท้องผูก มือเท้าชาแขนขาอ่อนโรย เจ็บปวดเมื่อยตามร่างกาย เวียนศีรษะพะอืดพะอมเสียดท้องคลื่นไส้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ปวดทวารหนักทวารเบาปัสสาวะขัด
- **Peripheral neuropathy** with Circulatory insufficiency and Autonomic nervous system disorder in chronic disease



ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ

น้ำมันสนั่นไตรภพ

ที่มาของตำรับยา ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

“สิทธิการิยะ จะกล่าวลักษณะกระษัยโรคอันบังเกิดขึ้นเป็นอุปาทิก คือ
กระษัยเหล็กนั้นเป็นกำรบ ๓ มีประเภทการะทำให้หน้าเห่นาและท้องน้อยนั้น
แข็งดุจแผ่นศิลา และจะไหวตัวไปมาก็มิได้ ครั้นแก่เข้าแข็งลามขึ้นไปถึงยอ
ดอก และให้บริโภคอาหารมิได้ ให้ปวดขบคั่งจะขาดใจตายดังนี้ ฯ

ขนานหนึ่งเอาใบกะเพรา ใบแมงลัก ผักเสี้ยนผี กระชาย กัญชา พริกไทย
หอมแดง หญ่าไซ เกลือสมุทร ถูกคั้ดเค้า ดำเอาน้ำสิ่งละทะนาน น้ำมันงา



ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ

ทะนนานหนึ่งหุงกงแต่น้ำมันเอา ลูกจันทน์ กระวาน กานพลู เทียนดำ เทียนขาว
การบูร สิ่งละ ๑ สติง บดปรงลงในน้ำมัน จึงเอามาทาท้องริดเสียให้ได้ ๓ วัน
ก่อนแล้วจึงกินน้ำมันนี้ ๓ วัน หายคีนัก น้ำมันชื่อ สนั่นไตรภพ ครอบदानทุก
ประการ ฯ”

สูตรตำรับยา ประกอบด้วยตัวยา ๑๑ ชนิด รวมน้ำหนัก ๑ ส่วน
หมายเหตุ ในตำราของขุนนิเทศสุขกิจ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ มีจึง ๑
 กิโลกรัม (น้ำหนักสด)
สรรพคุณ แก้ก้อนกษัยทั้งปวง ครอบदानทุกประการ
รูปแบบยา ยาน้ำมัน (หุงให้กงแต่น้ำมัน)



ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ

ตัวยา	น้ำหนักยา
ใบกะเพรา	๑ กิโลกรัม (น้ำหนักตัวยาสด)
ใบแมงลัก	๑ กิโลกรัม (น้ำหนักตัวยาสด)
ผักเสี้ยนผี	๑ กิโลกรัม (น้ำหนักตัวยาสด)
กระชาย	๑ กิโลกรัม (น้ำหนักตัวยาสด)
กัญชา	๑ กิโลกรัม (น้ำหนักตัวยาสด)
พริกไทย	๑ กิโลกรัม (น้ำหนักตัวยาสด)
หอมแดง	๑ กิโลกรัม (น้ำหนักตัวยาสด)
หญ้าไทร	๑ กิโลกรัม (น้ำหนักตัวยาสด)
เกลือสมุทร	๑ กิโลกรัม
ลูกคัสเค้า	๑ กิโลกรัม (น้ำหนักตัวยาสด)

ตัวยา	น้ำหนักยา
ลูกจันทน์	๑ สิ่ง
กะวาน	๑ สิ่ง
กานพลู	๑ สิ่ง
เทียนดำ	๑ สิ่ง
เทียนขาว	๑ สิ่ง
การบูร	๑ สิ่ง
น้ำมันงา	๑ ทะนาน

- ประกอบด้วยตัวยา ๑๗ ชนิด
 - คำรับนี้มี گیยา ๑ ใน ๑๐ ส่วน หรือประมาณร้อยละ ๑๐ เท่ากับกับยาอื่น จึงเป็นตัวยาหลัก
- แก้กษัยเหล็ก แก้กดันทุกประเภท แก้กอาการที่หัวหน้าท้องน้อยแข็งเกร็งเวลาชยับแล้วปวด เป็นมากจะเจ็บตึงถึงยอดอก กินอาหารไม่ได้
- Pelvic peritonitis: Chronic disease with peritonitis, Pelvic CA with carcinomatosis peritonei



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

- กษัย
 - เป็นกลุ่มโรคที่เป็นเรื้อรังเป็นเวลานานจนทำให้กินอาหารไม่ได้นอนไม่หลับแล้วทำให้ร่างกายทรุดโทรมผอมเหลืองซูบซีดส่วนใหญ่เป็นอุปาทิกะโรค (โรคที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ทราบสาเหตุ)
- กษัยเหล็ก
 - มีอาการปวดในอุ้งเชิงกรานคล้ายการอักเสบของเยื่อบุภายในช่องท้องบริเวณอุ้งเชิงกราน (Pelvic peritonitis) ทำให้มีอาการปวดมากโดยเฉพาะเวลาชยับเคลื่อนไหวร่างกาย (Tender & Rebound tender)
 - หน้าท้องบริเวณท้องน้อยมีอาการแข็งเกร็ง (Rigidity) เป็นอาการที่เรื้อรังแล้วกำเริบมากขึ้นจนมีอาการอักเสบของเยื่อบุภายในช่องท้องที่อื่นด้วย (Generalized peritonitis) จึงทำให้ “ครั้นแก่เข้าแข็งลามขึ้นไปถึงยอดอก”
 - อาการเข้ากันได้กับโรคเนื้องอกเนื้อร้ายของอวัยวะบริเวณนี้ เช่น รังไข่ มดลูก ปากมดลูก ต่อมลูกหมาก หรืออาจจะเกิดเนื้อร้ายจากที่อื่นแล้วกระจายลุกลามมาบริเวณนี้ก่อนแล้วจึงกระจายทั่วไปในช่องท้อง



น้ำมันสนั่นไตรภพ

ที่มาของตำรับยา ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

“สิทธิการิยะ จะกล่าวลักษณะกระษัยโรคอันบังเกิดขึ้นเป็นอุปาทิก คือกระษัยเหล็กนั้นเป็นคำรบ ๓ มีประเภทกระทำให้น้ำหน้าและท้องน้อยนั้นแข็ง ดุจแผ่นศิลา และจะไหวตัวไปมาก็มิได้ ครั้นแก้เข้าแข็งลามขึ้นไปถึงยอดอก และให้ บริโภคอาหารมิได้ให้ปวดขบดังจะขาดใจตาย

ขนานหนึ่งเอาใบกะเพรา ใบแมงลัก ใบเลี่ยนผี กระชาย กัญชา พริกไทย หอมแดง หญ้าไซ เกลือ ลูกคัดเค้า ตำเอาน้ำสิ่งละทะนาน น้ำมันงา ทะนานหนึ่ง หุงคแต่้ำมัน เอาลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลูเทียนดำ เทียนขาว การบูร สิ่งละ ๑ สลึง บดปรงลงในน้ำมัน จึงเอามาทาริดเสียให้ได้ ๓ วัน ก่อน แล้วจึงกินน้ำมันนี้ ๓ วัน หายตันทัน น้ำมันชื่อ สนั่นไตรภพ ครอบदानทุก ประการ ฯ



ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ขนาดและวิธีการใช้ ใช้น้ำมันทาริดท้อง ๓ วันก่อน แล้วจึงรับประทานน้ำมัน
๓ วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม - ตำรับนี้อยู่ในรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ

พุทธศักราช ๒๕๖๑

- เป็นตำรับหนึ่งที่ใช้ในโครงการวิจัยตำรับยาแผนไทยที่มี
กัญชาเป็นส่วนประกอบ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

เอกสารอ้างอิง โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ. ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระนคร, พระบาทสมเด็จพระนั่ง

น้ำมันสนั่นไตรภพ



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

รูปแบบยา : ยาน้ำมัน (หุงให้คงแต่น้ำมัน)

สรรพคุณ : แก้ร้อนกษัยทั้งปวง ครอบตานทุกประการ

ขนาดและวิธีการใช้ : ใช้น้ำมันทาโรคท้อง ๓ วันก่อน แล้วจึงรับประทาน ๓ วัน

สูตรตำรับยา ประกอบด้วยตำยา ๑๗ ชนิด รวมน้ำหนัก ๗ ส่วน

ลำดับที่	สมุนไพร	น้ำหนัก	การเตรียมยาก่อนปรุง
๑	ใบกะเพรา	๑ ทะนาน	<ul style="list-style-type: none"> - สับ เคล้าและเติมน้ำเล็กน้อย หมักไว้ จากนั้นนำไปโม่ในเครื่องโม่แป้ง ให้หยกลงในผ้ากรองแล้วบีบเอาน้ำออกมา - สับและใส่น้ำเล็กน้อยแล้วนำไปปั่น และคั้นน้ำออกมา - คั้นแยกกากโดยไม่ผสมน้ำ ใบกะเพรา ใบแมงลัก ใบเสี้ยนผี ที่สดใหม่สิ่งละ ๕ กก.หากรับมาไวแล้วทำจะได้น้ำประมาณ ๒.๕ ลิตร หากรับมาเช้าจะได้น้ำ ๑.๕ ลิตร หากเหลือแล้วแช่แข็งไว้
๒	ใบแมงลัก	๑ ทะนาน	
๓	ใบเสี้ยนผี	๑ ทะนาน	

ลำดับที่	สมุนไพร	น้ำหนัก	การเตรียมยาก่อนปรุง
๔	กระชาย	๑ ทะนาน	กระชายจะใช้หัว ๒ กก. ราก ๒ กก. คั้นโดยเครื่องคั้นแยกกาก
๕	กัญชา	๑ ทะนาน	ใบกัญชา คั้นโดยเครื่องคั้นข้าวสาลี
๖	พริกไทย	๑ ทะนาน	คั้นน้ำจากพริกไทยอ่อน โดยใช้เครื่องคั้นแยกกาก
๗	หอมแดง	๑ ทะนาน	หอมแดง(หอมแกง) คั้นโดยเครื่องคั้นแยกกาก
๘	หญ้าไซ	๑ ทะนาน	หญ้าไซ ประมาณ ๔ กก. คั้นโดยเครื่องคั้นแยกกาก จะได้น้ำประมาณ ๑.๕ ลิตร
๙	ลูกคัดเค้า	๑ ทะนาน	ลูกคัดเค้าหากหาไม่ได้ นำลูกคัดเค้าแห้งไปแช่น้ำให้พองเต็มที่ จากนั้นคั้นโดยเครื่องคั้นแยกกาก

ลำดับที่	สมุนไพร	น้ำหนัก	การเตรียมยาก่อนปรุง
๑๐	เกลือ	๑ ทะนาน	
๑๑	น้ำมันงา	๑ ทะนาน	
๑๒	ลูกจันทร์	๑ สติง	
๑๓	ดอกจันทร์	๑ สติง	
๑๔	กระวาน	๑ สติง	
๑๕	กานพลู	๑ สติง	
๑๖	เทียนดำ	๑ สติง	
๑๗	เทียนขาว	๑ สติง	
๑๘	การบูร	๑ สติง	
๑๙	ขิง	๑ สติง	ขิง คั้น โดยเครื่องคั้นแยกกาก (สูตรอาจารย์เนตรดาว)

ลำดับขั้นตอนการปรุง

- ผสมน้ำใบกะเพรา ใบแมงลัก ใบเลี่ยนผี กระชาย กัญชา พริกไทย หอมแดง หู้าไช เกลือ ลูกคัตเค้า สิ่งละ ๑ ทะนาน และใส่น้ำมันงา ๑ ทะนาน เคี่ยวจนข้น แล้วช้อนเอาแต่น้ำมัน ออกมา อย่าให้ติดน้ำขึ้นมาเพราะยาจะเสียได้ เคี่ยวข้ามคืน ตักกับน้ำและน้ำมันใส่ถุง แช่เย็น เมื่อ ไขมันกับน้ำแยกกันชัดเจนแล้วแยกส่วนที่เป็นน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนออกมา

- นำลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู เทียนดำ เทียนขาว บุพอแตก ใส่หม้อเคี่ยวกับ น้ำมันโดยใช้ไฟอ่อนถึงปานกลาง จะขึ้นฟองฟู เมื่อฟูมากๆจนฟองยุบตัวลงหรือฟองละเอียดมากๆ ถือ ว่าใช้ได้แล้วให้เตรียมกรองยา

- ใส่การบูรในภาชนะแล้วเทน้ำมันที่เคี่ยวลงในภาชนะนั้น กรองโดยใช้ผ้ากรองสี (หากใช้ ผ้าขาวบางกรองจะเสียน้ำมันไปกับผ้ามาก) หลังจากนั้นคนจนการบูรละลาย พักยาให้เย็น แล้วกรอก ใส่ขวดเก็บไว้

หมายเหตุ : ในตำราของขุนนิเทศสุขกิจ ยาน้ำมันสนั่นไตร มีขิง ๑ กิโลกรัม (น้ำหนักสด)

ขนาดและวิธีการใช้ของอ.เนตรดาว



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine






การเริ่มใช้น้ำมันสนั่นไตรภพจะเริ่มจาก **การทา ก่อน ๓ วัน รับประทาน ๑ วัน** ต่อจากนั้นให้ทา **๓ วัน รับประทาน ๒ วัน** และสุดท้ายจึงทา **๓ วัน รับประทาน ๓ วัน**

เพื่อประเมินอาการตอบสนองของผู้ป่วยต่อการใช้ยา หากผู้ป่วยรับกับยาได้ดี (สังเกตจากผู้ป่วยช่องท้องยุบและถ่ายออกมาเป็นสีเขียว) ให้ใช้วิธีการทาวนละ ๑ ครั้ง ตอนเย็น และรับประทาน ๑ ครั้ง ตอนเช้า

ขนาดและวิธีการใช้ของอ.เนตรดาว



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

-  วิธีการทา : ใช้นํ้ามันขนาดประมาณ ๑๐ บาท ทาริดหน้าท้องโค้งตามระบบลำไส้ใหญ่(หมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าหาสะดือ) รีดจนน้ำมันซึมลงท้องคนไข้และมือของหมอ โดยใช้ในกาลสมุฏฐานวาตะและเสมหะมาเจือ (เวลาประมาณ ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.) หลังจากใช้วันแรก ผู้ป่วยหลายท่านจะถ่ายอุจจาระสีเขียว
-  วิธีการรับประทาน : รับประทานครั้งละ ๕ หยดและดื่มนํ้าอุ่นตาม รับประทานเช้าและก่อนนอน
-  วิธีการเก็บรักษา : เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้นาน ๑ ปี กลิ่นจะเปลี่ยนแต่สรรพคุณเหมือนเดิม ระวังไม่ให้โดนน้ำและแสงแดด เพราะยาจะเสียโดยจะขึ้นเป็นคราบสีขาวเล็กๆ

ยาไพสาลี

ที่มาของตำรับยา อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทศสุขกิจ) เล่ม ๒ (๑)

“๒๑๓๕. ยา ไพสาลี ว่า พระพุทธเจ้า ทรงให้พระอานนท์ทำแจกเป็นทาน
เอาลูกจันทน์ ดอกจันทน์ สิ่งละ ๑ สติง กระวาน ๑ สติง ๑ เพ็อง กานพลู ๒
สติง ดีปลี ๒ สติง ๑ เพ็อง ลูกพิลังกาสา ๓ สติง ว่านนํ้า ๓ สติง ๑ เพ็อง เกลือ
สินเธาว์ ๑ บาท เทียนดำ ๑ เพ็อง เทียนเยาพาณี ๖ สติง ๑ เพ็อง การบูร ๗ สติง
สมอเทศ ๗ สติง ๑ เพ็อง เทียนข้าวเปลือก ๖ สติง สมอไทย ๒ บาท สมอพิเภก
๒ บาท ๑ เพ็อง โกฐสอ ๕ สติง โกฐเขมา ๕ สติง ๑ เพ็อง บุกรอ ๗ สติง ขิง



ยาไพสาลี

แห้ง ๑๐ สลึง ๑ เฟื้อง เจตมูลเพลิง ๗ สลึง หัสคุณเทศ ๕ บาท กัญชา ๓๐ บาท
พริกไทยร้อน ๖๐ บาท ยาทั้งนี้ทำเป็นผงละลายน้ำผึ้งน้ำอ้อยแดง นำนมโคก
ได้ กิน หน้า ๑ สลึง กิน ๓ เวลา แก้กษารพัดโรค ไล่เลื้อนกล่อน หืดไอ กุญจ
เสมหะ ตามืด ตาฟาง หูหนวก หูดัง ลมสติ้มกหลงลืม เจ็บตะโพก จุกเสียด ลม
สลักอก ขี้เรื้อน คุดทะราด เป็นฝีในเพดานและลำคอ ลมมักให้หาวเรอ ให้ราก
สะอึก ลมสะแกเวียน นอนไม่หลับ ให้ง่วงเหงาหาวนอน ลมปวดมวนในท้อง
เป็นป้างเป็นจุกผาม้ามย่อย หงอย เพื่อ พุดมิซัด (คล้ายอภัยสาลี ขนาน
๑๘๓๒) ”

สูตรตำรับยา ประกอบด้วยตัวยา ๒๓ ชนิด รวมน้ำหนัก ๑๒๑ บาท ๑ สลึง ๑
เฟื้อง

สรรพคุณ แก่สารพัดโรค ไล่เลื้อนกล่อน หืดไอ กุญแจง เสมหะ ตามืด ตาฟาง
หูหนวก หูตึง ลมสติ้มกหลงลิ้ม เจ็บตะโพก จุกเสียด ลมสลักอก จี
เรื้อน คุดทะราด เป็นฝีในเพดานและลำคอ ลมมักให้หาวเรอ ให้
รากสะอึก ลมสะแกเวียน นอนไม่หลับ ให้ง่วงเหงาหาวนอน ลม
ปวดมวนในท้อง เป็นป้างเป็นจุกผามม้ามย่อย หงอย เพ้อ พุดมิซัด

รูปแบบยา ยาผง



ขนาดและวิธีการใช้ รับประทานครั้งละ ๑ สติง กิน ๓ เวลา ละลายน้ำผึ้ง
น้ำอ้อยแดง หรือนมโคก็ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม - ป้าง น. อาการม้ามโต มักเกิดในเด็ก อาจเกิดจากสาเหตุ
ต่างๆ ได้หลายอย่าง เช่น ไข้จับสันเรื้อรัง โรคทาลัสซีเมีย ผู้ป่วยมัก
มีไข้คลุมเครือเรื้อรังร่วมด้วย จึงมักเรียก ไข้ป้าง. (๒)

- ลมสะแกเวียน น. ลมวิงเวียน (ความเห็นของอาจารย์แพทย์แผน
ไทย)

เอกสารอ้างอิง

ยาอโภยสารลี

ที่มาของตำรับยา เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑, ๒, ๓ พระยาพิศณุ
ประสารทเวช ร.ศ. ๑๒๘

“ยาอโภยสารลี เอาลูกจัน ๑ สลึง ดอกจัน ๒ สลึง ลูกกระวาน ๓ สลึง
กานพลู ๑ บาท ลูกพิลังกาสา ๑ บาท ๒ สลึง ว่านนํ้า ๑ บาท ๓ สลึง โกฐสอ ๒
บาท โกฐเขมา ๒ บาท ๑ สลึง เทียนเข้าเปลือก ๒ บาท ๒ สลึง เทียนแดง ๒
บาท ๓ สลึง เทียนขาว ๒ บาท เทียนตาฉักแตน ๒ บาท ๑ สลึง เจตมูลเพลิง ๓
บาท สมอไทย ๓ บาท ๑ สลึง สมอเทศ ๓ บาท ๑ สลึง หัวบุงกรอ ๓ บาท ๓

ยาอโภยสาลี



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

สลิ้ง สหัชศุณเทศ ๑ ตำลึง ๒ บาท จันทน์เทศ ๑ ตำลึง กัญชา ๓ บาท ๓ สลิ้ง
พริกอ่อน ๑ ตำลึง กินเช้าเย็นทุกวัน แก้วสารพัดผสม ๘๐ จำพวก แก้วโลหิต ๒๐
จำพวก แก้วรัตติกาล ๒๐ จำพวก ยานี้กินได้ ๓ เดือน หายโรคพยาธิมิได้มีเลย
ยาอายุวัฒนะทั้งเกิดปัญญารู้หลักนักปราชญ์มากกว่าคนทั้งปวง ถ้าผู้ใดพบให้
ทำกินวิเศษนัก ใครกินยานี้ดูจิตยาทิพย์นั้นแล ฯ”

สูตรตำรับยา ประกอบด้วยตัวยา ๒๐ ชนิด รวมน้ำหนัก ๕๐ บาท ๒ สลิ้ง
สรรพคุณ แก้วสารพัดผสม ๘๐ จำพวก แก้วโลหิต ๒๐ จำพวก แก้วรัตติกาล
๒๐ จำพวก
รูปแบบยา ยาผง



หน้า ๑๓

ยาอโภยสาลี

ตัวยา	น้ำหนักยา
ลูกจันทน์	๑ สลึง
ดอกจันทน์	๒ สลึง
กระวาน	๓ สลึง
กานพลู	๑ บาท
พิลังกาสา	๑ บาท ๒ สลึง
ว่านน้ำ	๑ บาท ๓ สลึง
โกฐสอ	๒ บาท
โกฐเขมา	๒ บาท ๑ สลึง
เทียนข้าวเปลือก	๒ บาท ๒ สลึง
เทียนแดง	๒ บาท ๓ สลึง
เทียนขาว	๒ บาท

ตัวยา	น้ำหนักยา
เทียนตาคักแตน	๒ บาท ๑ สลึง
เจตมูลเพลิง	๓ บาท
สมอไทย	๓ บาท ๑ สลึง
สมอเทศ	๓ บาท ๑ สลึง
บุงร่อ	๓ บาท ๓ สลึง
สหัสศคุณเทศ	๑ ตำลึง ๒ บาท
แก่นจันทน์เทศ	๑ ตำลึง
กัญชา	๓ บาท ๓ สลึง
พริกไทยล่อน	๑ ตำลึง

ขนาดและวิธีการใช้ รับประทาน วันละ ๒ ครั้ง เข้า – เย็น

- พริกไทยเป็นตัวยาหลัก ตำรับยาช่วยการทำงานของระบบประสาทและการกระจายเลือด
- กัญชาเป็นตัวยารองที่ช่วยเรื่องจิตใจและช่วยเจริญอาหาร



ชื่อยา/ตำรับ	โรค/อาการ
1. สุขไสยาสน์	-นอนไม่หลับ
	-เบื่ออาหาร
2. ทำลายพระสุเมรุ	-อัมพฤกษ์
	-อัมพาต
	-ชา
3. แก้มลมแก้เส้น	- ลมปลายปัดคอต สัญญาณ 1, 3, 4 และ 5
	- อัมพฤกษ์
	- ลมจับโปงแห้ง (ข้อเข่าเสื่อม)
อัคคินี้วคณะ	ยังไม่มี การสั่งการรักษา
ไพศาลี	ยังไม่มี การสั่งการรักษา




ชื่อยา/ตำรับ	โรค/อาการ
4. รีดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง	-เรื้อนกวาง (สะเก็ดเงิน) -รีดสีดวงทวารหนัก -ตะไคร่ฟักการ (ผื่นผิวหนังด้านนอก)
5. อัมฤตย์โอสถ	-ลมปลายปัตคาคต สัญญาณ 1, 3, 4 และ 5
6. ไกยสาลี	-ปัปผาสังฟักการ (มะเร็งปอด และมะเร็งที่แพร่กระจายมาปอด) -โรคภูมิแพ้
7. ไฟอาวุธ	-ยกลงฟักการ (มะเร็งตับและมะเร็งที่แพร่กระจายมาที่ตับ)

คู่มือการจัดตั้งคลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพ

กระบวนการจัดตั้งคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย

แนวเวชปฏิบัติการใช้ตำรับยา
แผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม



การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล



ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ

ผู้ป่วย

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

กรณีผู้ป่วยรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ผ่าน App./มาไม่ตรงนัด

ลงทะเบียนแล้ว

เวชระเบียน

ลงระบบข้อมูล/ทำประวัติผู้ป่วย/Check in

ลงข้อมูล/ลงระบบ
สปสช HPVC, C-moph,
Red Cap

รับยา

คัดแยกคิว


ชำระเงิน

คัดกรอง

โดยทีมสหวิชาชีพ

ตรวจวินิจฉัย/
สั่งการรักษา

โดยแพทย์/แพทย์แผน
ไทย/แพทย์แผนไทย
ประยุกต์



Incrusion Criteria

1. เป็นผู้มีอาการหรือเป็นโรคที่เข้าเกณฑ์ตามแนวเวชปฏิบัติในการเข้ารับการรักษาด้วยตำรับยา
2. ภาวะที่แพทย์/แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ เห็นสมควรได้รับการรักษาด้วยตำรับยา
3. ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่ (Vital Sign Stable & Clinically Stable)
4. มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเข้าใจ



Excursion Criteria

1. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้กัญชาและส่วนประกอบอื่นๆ ในตำรับยา
2. ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยตรงตามอาการหรือโรคตามแนวเวชปฏิบัติการใช้ตำรับยา
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังขั้นรุนแรงหรือไม่สามารถคุมอาการได้
4. ผู้ป่วยที่มีภาวะ การทำงานของตับและไตผิดปกติ
5. ผู้ป่วยมีภาวะทางคลินิกอื่น ซึ่งแพทย์เห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
6. อยู่ในช่วงการตั้งครรภ์/ให้นมบุตร
7. ผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคติดเชื้อระยะแพร่กระจาย
8. ผู้ป่วยที่เป็นจิตเวช
9. ผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด

การประเมินผลและการติดตามผล

ประเมินอาการทางคลินิก ดังนี้

- การประเมิน Pain Score
- การประเมิน PPS สำหรับผู้ป่วยแบบประคับประคอง
- การประเมิน ESAS สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย 9 อาการ
- การประเมิน EQ-5D-5L สำหรับผู้ป่วยทั่วไป 5 ด้าน
- การประเมิน PSQI สำหรับผู้ป่วยอาการนอนไม่หลับ

ปรับการรักษา

- มีการปรับจ่ายยาสมุนไพรดำรับต่างๆ
- ปรับการบำบัดการอื่นๆ ตามความเหมาะสม อาทิ การนวด ประคบ พอก หรือ แช่สมุนไพร เป็นต้น



Edmonton Symptom Assessment System revised version (ESAS-R)												
Please circle the number that best describes how you feel NOW:												
No Pain	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Worst Possible Pain
No Tiredness (tiredness = part of being sick)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Worst Possible Tiredness
No Drowsiness (drowsiness = feeling sleepy)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Worst Possible Drowsiness
No Nausea	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Worst Possible Nausea
No Lack of Appetite	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Worst Possible Lack of Appetite
No Shortness of Breath	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Worst Possible Shortness of Breath
No Depression (depression = feeling sad)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Worst Possible Depression
No Anxiously (anxiously = feeling nervous)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Worst Possible Anxiety
Best Wellbeing (best = how you feel best)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Worst Possible Wellbeing
No _____ (Other Problems like example conditions)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Worst Possible _____

Patient's Name _____ Date _____ Time _____

Completed by (check one)
☐ Patient
☐ Family caregiver
☐ Health-care professional caregiver
☐ Caregiver-assisted



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION



THANK YOU

